b) Contenu.—Incorporer la substance la moins retive possible, la pommade n'ayant d'autre but à cette période que : 1. d'éviter le contact de l'air qui est la cause des démangeaisons ; 2. d'empêcher la formation de croûtes qui irritent secondairement la peau. Par exemple :

VaselineLanoline	}aa 10	grammes.
Oxyde de zinc	. 4	_

Comment appliquer cette pommade?—Ces détails de technique, d'apparence puérile, sont très importants; car la manière

de donner vaut mieux que ce que l'on donne.

a) Sur le pavillon.—Étaler une bonne couche de pommade sur un morceau de toile très fine; envelopper le pavillon avec ce linge gras, en ayant soin de l'appliquer exactement dans toutes les anfractuosités; recouvrir d'ouate; maintenir avec un tour de bande. Et renouveler ce pansement chaque jour, jusqu'à ce que l'épiderme se répare.

b) Dans le conduit.—Lutter contre la sténose du conduit est l'indication capitale. Chaque jour, introduire dans le conduit, avec une pince coudée, une mèche d'ouate enduite de pommade, de grosseur croissante. A chaque renouvellement de mèche, bien déblayer le conduit encombré de squames ; et faire ce nettoyage

avec un porte-coton, jamais en seringuant.

Seconde période.—L'irritation initiale est calmée. Indication nouvelle: Prévenir la chronicité. Donc: instituons une médication modificatrice.

C'est ici qu'il va falloir tenir un grand compte de la suscep-

tibilité individuelle des différentes peaux.

a) Dans les cas les plus simples: Dès que les croûtes cessent de se reproduire, on dcit interrompre les enveloppements gras.

L'épiderme nouveau sera pendant quelque temps protégé par une fine couche de pâte de Lassar.

Vaseline	20	grammes.
Amidon Oxyde de zinc Acide salicylique	ââ 10	grammes.
Acide salicylique	0	gr. 50

b) Si malgré cela la guérison tarde : S'adresser à des topiques plus actifs.

a) Les substances les plus actives sont: le calomel, 1/20; l'oxyde jaune de mercure, 1/20; l'huile de cade, 1/10; le goudron, 1/10; l'ichthyol, 1/10.

b) A incorporer dans la vaseline, pour le pavillon; dans l'huile

d'olive pour l conduit.

c) L'application en sera faite deux fois par jour par le malade lui-même: avec un tampon d'ouate, sur le pavillon; avec un petit pinceau de blaireau, dans le conduit. Mais deux fois par semaine il devra montrer son oreille au médecin, pour éviter la surdité par engouement du conduit: celui-ci devra être dé-