

presque régulier, peu rétrécie vers la radiale. Pattes sans aucune tache, médiocrement épineuses. Abdomen sessile, court, ovale, convexe, le 1er segment avec poils grisâtres mais peu denses.

Capturé à Chicoutimi; voisin de l'*argenteus*, Cress., mais s'en distinguant surtout par la longue pubescence de son prothorax et la forme de sa 3e cellule cubitale.

5. Pompile de-Philadelphie. *Pompilus Philadelphicus*, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. i, p. 87, ♀ ♂.

♀—Long. .58 pce. D'un noir velouté sans tache, avec reflets bleuâtres. Chaperon obtusément échancré. Bord postérieur du prothorax anguleux; métathorax arrondi, avec une ligne médiane enfoncée. Ailes d'un beau violet brun, l'extrémité plus foncée, la cellule radiale longue, lancéolée, son extrémité oblique, aiguë, la 2e cellule cubitale grande, en carré oblique, la 3e rétrécie à la radiale. Abdomen ovale-oblong, avec efflorescence bleuâtre surtout à la base des segments.—PC.

Bien distinct du précédent par les cellules de ses ailes,

6. Pompile hyacinthe. *Pompilus hyacinthinus*, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. i, p. 90, ♀.

♀—Long. .38 pce. Bleu noirâtre, à réflexions purpurines sous un certain jour. Chaperon tronqué en avant. Tête fortement comprimée. Antennes courtes, soyeuses. Prothorax à bord postérieur faiblement échancré. Ailes enfumées, à réflexion violette, la cellule radiale sublancoélée, large et un peu courte, la 2e cubitale en carré oblique, la 3e plus longue, fortement rétrécie sur la radiale. Tarses antérieurs fortement ciliés. Abdomen ovale-oblong, convexe, sessile, à efflorescence bleue fortement prononcée, avec réflexion purpurine sous un certain jour.—C.

7. Pompile de-Virginie. *Pompilus Virginiensis*, Cress. Trans. Am. Ent. Soc. i. p. 92, ♂

♂—Long. .28 pce. Noir avec une fine pubescence brillante, argentée, plus apparente sur la face et le métathorax. Chaperon à bord antérieur subtronqué ou légèrement arqué. Bord postérieur du prothorax anguleux. Antennes fortes, noires; la face soyeuse-argentée, de même que le métathorax. Ailes subhyalines, iridescentes, le sommet traversé par une bande plus obscure; la cellule radiale longue et lancéolée, la 2e cubitale en carré oblique, la 3e plus petite, subtriangulaire, très rétrécie à la radiale. Pattes peu épineuses, les hanches