

Les Grimpeurs de notre faune se rangent en deux familles, savoir : les Cuculides et les Picides, qu'on peut distinguer par les caractères suivants :

Bec mince, grêle, un peu long, à pointe plus ou moins recourbée... CUCULIDES.  
Bec droit, raide, terminé en forme de ciseau ..... PICIDES.

### I Famille, LES CUCULIDES.

Bec grêle, courbé, aussi long que la tête, atténué à l'extrémité ; narines linéaires ; ailes longues, atteignant le milieu de la queue ; tertiaires courtes ; queue à 10 plumes graduées ; tarses plus courts que le doigt médian.

Cette famille, dans notre faune, se compose du seul genre Coucou qui ne renferme que deux espèces.

Genre COUCOU. *Coccygus*, Vieillot.

Mêmes caractères que ceux de la famille.

1. **Concou à bec jaune.** *Coccygus Americanus*, Bonap. *Cuculus Americanus*, Linn. *C. Carolinensis*, Wils.—Angl. *The yellow-billed Cuckoo*.—Longueur 12 pouces ; ailes 6-6½ ; queue 6-6½. Mandibule supérieure avec l'extrémité de l'inférieure noire, le reste jaune, de même que le bord tranchant de la supérieure. Parties supérieures d'un olivâtre métallique, cendré vers le bec ; parties inférieures blanches. Plumes de la queue noires, terminées de blanc ; iris brune.

Er. Se rencontre dans Ontario, quoique rarement. On n'a pas encore que nous sachions signalé sa présence à Québec. Niche dans des buissons près de terre, pond 4 œufs d'un bleu verdâtre.

2. **Le Coucou à bec noir.** *Coccygus erythrophthalmus*, Bonap. *Coccyzus*, Aud. *Cuculus erythrophthalmus*, Lin.—Angl. *The black-billed Cuckoo*.—Longueur 12 pouces ; ailes 5 ; queue 6½. Bec entièrement noir ; iris noisette. Parties supérieures d'un olive verdâtre métallique, cendré vers la base du bec ; dessous blanc pur avec teinte de jaune brunâtre à la gorge ; bord interne des plumes alaires teint de canelle ; dessous de la queue cendré. Œil entouré par une bande de peau nue, rouge.

E. et A C. Le Coucou qui est qualifié en Europe de brigand, d'infâme, eu égard aux déprédations qu'il exerce sur les nids des hôtes ailés des bois et des bocages, n'est ici qu'un oiseau utile, se nourrissant particulièrement d'insectes, de larves et de fruits sauvages. Il ne paraît pas dédaigner les œufs des merles et des pinsons lorsqu'il en rencontre,