

## 讓妻奇談

恨

「是嗎？」

「.....」

又開口，說：「英英，我

二人沉默了一會，他

「其麼事？」

「我如果得不到我的

愛，我將會獨身終老，」

「你不相信？」

「那不是相信與不相信的問題，那

汝又何苦呢？」

「一個人得不到應該愛的人，何苦

要結婚？」

「那是我害苦了汝，」

他苦笑說：「這與汝無關，這是我

自作多情。」

「假如汝不結婚，我感到不安的

痛苦，世上比得好上百倍女人多着，你父

母，」

「我個人的觀念認爲，初戀很重要

不要電這些沒有結果的事。」黃漢龍幾

，一個人只能戀愛一次。第二次就沒有

意思了。」

她說：「那你就應該諒解我，我也

是爲了不想作兩次的戀愛。」

他竟抖擗，說：「好了，我們還是

自作多情。」

「假如汝不結婚，我感到不安的

痛苦，世上比得好上百倍女人多着，你父

母，」

「我個人的觀念認爲，初戀很重要

不要電這些沒有結果的事。」黃漢龍幾

，一個人只能戀愛一次。第二次就沒有

意思了。」

他笑說：「你又來挖苦我了。」

到了週末那天，他帶她去參加生

日舞會，他們跟其他人在跳舞，柔

的音樂，使他們都有點醉醺，雙雙舞影

在柔和的灯光下盪漾，他緊緊地摟着

她，她盡力地使他離開一些，他還把臉

面上貼上去，她也盡量閃避。

「這是給情侶們安排的，我們要退

出。」

伊偉仁不肯，說：「汝就權充我的

情人吧，也好讓我在精神上享受一下，

(十四)

## 癌是否絕症？

(王家駿)

香港九龍黃大仙  
財帛觀音神廟設片打街東七百壹十九號門牌歡迎各界  
普男信女光臨參拜有求必應或外埠來信  
求簽代稟神求簽詳解答

電話：253-8974 司理人黃植強啓

地址：719 E. Pender St., Vancouver 4, B.C.

企連打

函商面議均好

中西餐館出讓

病

胃癌是最常見的壹種癌症，在男性

所患各種癌症總數中，佔三分之二以上

，女性之中約佔肆分之一，就是說

，在男子所患各種癌症中胃癌佔第一

，婦女的胃癌佔第二位（第一位是子宮

癌），病者最常見於肆至五十五歲之間

，但青年人有時也會出現，不過比較少

。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，

則肉眼所能見者爲廣泛，是豈能內生

性蔓延，中間○癌腫的情況，介於上述

兩類之間。

胃癌的病程，可分爲肆期，病變只

限於粘膜，不超過胃界者，稱第壹期，

病變侵入肌層和附近淋巴結，如胃上淋

巴結時，已進入第肆期，病變與鄰近臟

器黏連，同時侵犯了更多的淋巴結，如

胰腺附近、淋巴結時，稱第叁期。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，

則肉眼所能見者爲廣泛，是豈能內生

性蔓延，中間○癌腫的情況，介於上述

兩類之間。

胃癌的病程，可分爲肆期，病變只

限於粘膜，不超過胃界者，稱第壹期，

病變侵入肌層和附近淋巴結，如胃上淋

巴結時，已進入第肆期，病變與鄰近臟

器黏連，同時侵犯了更多的淋巴結，如

胰腺附近、淋巴結時，稱第叁期。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，

則肉眼所能見者爲廣泛，是豈能內生

性蔓延，中間○癌腫的情況，介於上述

兩類之間。

胃癌的病程，可分爲肆期，病變只

限於粘膜，不超過胃界者，稱第壹期，

病變侵入肌層和附近淋巴結，如胃上淋

巴結時，已進入第肆期，病變與鄰近臟

器黏連，同時侵犯了更多的淋巴結，如

胰腺附近、淋巴結時，稱第叁期。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，

則肉眼所能見者爲廣泛，是豈能內生

性蔓延，中間○癌腫的情況，介於上述

兩類之間。

胃癌的病程，可分爲肆期，病變只

限於粘膜，不超過胃界者，稱第壹期，

病變侵入肌層和附近淋巴結，如胃上淋

巴結時，已進入第肆期，病變與鄰近臟

器黏連，同時侵犯了更多的淋巴結，如

胰腺附近、淋巴結時，稱第叁期。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，

則肉眼所能見者爲廣泛，是豈能內生

性蔓延，中間○癌腫的情況，介於上述

兩類之間。

胃癌的病程，可分爲肆期，病變只

限於粘膜，不超過胃界者，稱第壹期，

病變侵入肌層和附近淋巴結，如胃上淋

巴結時，已進入第肆期，病變與鄰近臟

器黏連，同時侵犯了更多的淋巴結，如

胰腺附近、淋巴結時，稱第叁期。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，

則肉眼所能見者爲廣泛，是豈能內生

性蔓延，中間○癌腫的情況，介於上述

兩類之間。

胃癌的病程，可分爲肆期，病變只

限於粘膜，不超過胃界者，稱第壹期，

病變侵入肌層和附近淋巴結，如胃上淋

巴結時，已進入第肆期，病變與鄰近臟

器黏連，同時侵犯了更多的淋巴結，如

胰腺附近、淋巴結時，稱第叁期。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，

則肉眼所能見者爲廣泛，是豈能內生

性蔓延，中間○癌腫的情況，介於上述

兩類之間。

胃癌的病程，可分爲肆期，病變只

限於粘膜，不超過胃界者，稱第壹期，

病變侵入肌層和附近淋巴結，如胃上淋

巴結時，已進入第肆期，病變與鄰近臟

器黏連，同時侵犯了更多的淋巴結，如

胰腺附近、淋巴結時，稱第叁期。

病

理上胃癌可分爲潰瘍型、菜花型

和浸潤型等，也有些學者將它分爲內生

○、內生○和中間○各種，外生○癌，

細胞含量比較豐富，作彌散性的分佈，

內生○癌腫主要見於胃幽門前部，癌腫

的生長比較慢，但它實際蔓延的範圍，