de l'atropine; on peut dans ces cas y suppléer par l'emploi de la duboisine. (Prof. Foucher.)

Dans la néphrite parenchymateuse chronique (gros rein blane), les douleurs lombaires sont généralement plus intenses que dans les autres formes d'inflammation chronique du rein. (Prof. Laraméri)

M. le professeur LARAMÉE appuie sur l'importance qu'il ya pour les personnes prédisposées aux affections pulmonaires, né vralgiques et rhumatismales, de porter des gilets de laine.

Il faut se défier de l'action de l'ésérine dans certaines affections de la cornée compliquées d'iritis; la soudure complète du sphincer de l'iris peut en être le résultat. (Prof. FOUCHER.)

Chez les sujets à peau délicate et fine, l'emploi de l'onguent de soufre détermine souvent une irritation plus ou moins intense, et même de l'érythème. (Prof. LARAMÉE.)

La vulvo vaginite des enfants et des jeunes filles est due, la plupart du temps, à la présence des ascarides. Cos sujets sont contamment en mouvement, et, quand ils sont assis, ne peuvent tenir en place. (Prof. Laramée.)

Dans la pneumonie des vieillards, le point de côté est moins intense qu'il ne l'est chez l'adulte, d'une manière générale; la même chose se remarque chez les sujets ayant déjà eu des pneumonies du même côté. (Prof. Laramée.)

Chez les diabétiques, les rides de la face sont ordinairement très accentuées, et ce, d'autant plus que le sujet aura joui de plus d'embonpoint, ce qui donne aux malades l'apparence de vieillards précoces. (Prof. LARAMÉE.)

Dans un cas d'abcès de la glande vulvo vaginale avec hémorrhagie siégeant dans la glande, le traitement suivant est institué par M. le professeur Brennan: Incision du conduit au moyen de couteau de Weber, et instillation d'une solution éthérée d'iodo forme.