

des douleurs atroces particulièrement la nuit. Il n'y a plus que de l'orthopédie à faire.

Le deuxième cas, un nommé Brugère âgé de 21, garçon coiffeur. Il avait 19 ans quand il est tombé malade, rien aux antécédants, si ce n'est un père irascible. Le 4 septembre 1886, il éprouve un frisson, et, le même jour, le membre inférieur du côté droit est paralysé, sans douleur; le deuxième jour, par bravade, il veut reprendre son métier; mais, il est obligé de se remettre au lit, et, sans douleur encore, la jambe gauche est prise à son tour; la paraplégie est constituée. Le quatrième jour, la paralysie gagne le membre supérieur droit, de ce dernier le malade a recouvré, peu de temps après, l'usage sauf, en ce qui concerne les interosseux, les muscles du pouce, dont il n'a pu se servir qu'après un an. C'est un encouragement à poursuivre le traitement.

La restitution des mouvements du pouce pouvant être très importante pour ceux, par exemple, dont la profession est d'écrire ou de dessiner. On a remarqué au début une anomalie assez fréquente chez les adultes et même chez les gens d'un âge plus avancé. (Une paralysie infantile a été constaté chez un homme de 34 ans.) Cette anomalie chez notre malade consistait en une paralysie viscale, due au fait de diffusion mentionné plus haut, paralysie qui a duré 4 jours.

Dans l'état actuel il y a atrophie générale des deux membres inférieurs, coloration bleue, pied bot equin avec rétractions tendineuses; la sensibilité n'est nullement affectée.

Nous connaissons avec précision la lésion génératrice de la paralysie spinale infantile; mais en dehors de l'électricité nos moyens thérapeutiques ne sont guères puissants. Pendant l'état aigu, des pointes de feu rendront peut-être service; mais c'est pendant la période de restauration musculaire que l'électrisation, bien maniée, aura son effet.

Impressions maternelles.

Est-ce que le système nerveux reflexe de la mère peut causer certaines anomalies chez le fœtus?

Je pense qu'on peut mettre le système nerveux aussi bien en cause qu'on met le défaut de liquide amniotique, l'enroulement du cordon autour d'un membre ou la gangrène, etc. Comme produisant ces amputations intra-utérines qu'on observe assez rarement, voici un fait.

L'autre soir j'étais appelé à la campagne pour un accouchement; le travail a très bien été, mais la femme a mis au monde un enfant ayant la main gauche amputée au poignet. Le moignon est très bien fait; on