

qu'il est moins pénible, moins nocif, plus désinfectant et mieux désinfectant.

Quant aux sondes, je les nettoie, après usage, dans une solution de lusoforme à 5 p.c.; même toilette avant de s'en servir. Les bougies et sondes en gomme, en caoutchouc supportent on ne peut plus facilement le lusoforme qui les savonne, les dégraisse et les désinfecte sans altérer leur substance d'une manière appréciable, sans les ramollir comme l'ébullition.

En résumé, pour ne point étendre davantage cette revue clinique des applications du lusoforme aux maladies des voies génito-urinaires, ni entrer dans le détail des faits observés, le lusoforme est un des meilleurs antiseptiques dont nous pouvons nous servir efficacement (l'expérience pratique seule le prouve), pas toxique, peu douloureux, désodorisant, défergeant, il réunit les qualités requises pour la généralisation de son emploi et nul doute que, par la suite, il ne soit utilisé dans des cas où il ne nous a pas encore été donné de le substituer aux médicaments plus usuels.

Thérapeutique

TRAITEMENT DU DIABÈTE

Dieulafoy ne préconise pas une diète rigoureuse excluant d'une façon complète le sucre de l'alimentation des diabétiques. Il pense qu'un régime aussi sévère accroît les dangers résultant d'un amaigrissement rapide et surtout favorise le développement de la tuberculose qui toujours menace de venir compliquer l'évolution du diabète. Il recommande à ses clients diabétiques de s'abstenir de desserts sucrés, de pâtisseries et de confitures. Il leur recommande les œufs, le poisson sans sauce, et leur permet les viandes bouillies ou rôties, les légumes herbacés et le pain de gluten. De temps en temps des pommes de terre, des pois ou des légumes farineux du même genre. Le pain de gluten peut de temps en temps être remplacé par du pain grillé dont on mangera de préférence la croûte. La bière, le lait, le café, le thé sont permis, mais pour les sucrer le malade emploiera de la saccharine de préférence au sucre. L'hygiène du diabétique comprend les soins de la peau et les exercices hygiéniques. Les bains, les frictions, les douches, le massage sont indiqués. La peau doit être stimulée, mais non pas irritée. Les exercices physiques sont d'une importance capitale car ils ont pour effet de détruire le sucre formé dans les muscles, et dans

cet ordre d'idées il recommande la marche et la gymnastique. La transpiration abondante et la fatigue physique doivent être évitées, en raison de l'apparition fréquente du coma diabétique à la suite d'un excès physique. Sa thérapeutique préférée se résume à trois remèdes: l'antypirine, l'arsenic et les alcalins. Il les prescrit de la façon suivante: Pendant une semaine le malade prend 30 centigrammes d'antypirine et 20 centigrammes de bicarbonate de soude en un cachet après chaque repas. Durant la semaine suivante ces cachets sont supprimés et remplacés après chaque repas par une cuillerée à soupe d'une solution composée de 80 gr. d'eau distillée contenant 3 à 4 centig. d'arseniate de soude. Ces deux remèdes sont donnés alternativement semaines après semaines pendant plusieurs mois. En même temps le malade prend à ses repas une eau alcaline qui peut être additionnée ou non de vin à condition qu'il ne soit pas sucré.

(New York Medical Journal)

LE PROTARGOL DANS LES BRÛLURES

Muller recommande fortement l'emploi du protargol dans les cas de brûlures affirmant que la cicatrice obtenue est bien meilleure. La formule qu'il recommande est la suivante:

Protargol...	3.0 gram.
Dissous dans eau...	5.0 "
Mélangé à lanol anhyd...	12.0 "
Vaseline...	10.0 "

(Semaine Médicale)

ENRERITE AIGUE DES ENFANTS

Le Dr Schreiber assistant à l'Université de Goettingen dans un travail publié sur les organes digestifs de l'enfant, recommande l'usage de la tannopine à la dose de 0.25 à 0.5 gramme ou du tannigène à doses plus élevées, après évacuation des intestins à l'aide de calomel ou d'une irrigation intestinale. Il donne la préférence à la tannopine parce qu'elle se décompose en formaldéhyde qui agit comme désinfectant intestinal. D'autre part l'hémaxétylène-tétramine contenue dans la tannopine empêche l'urine de devenir alcaline et de subir la transformation ammoniacale. Il est bon de donner conjointement à ces médicaments de petites doses de calomel qui agit aussi comme désinfectant.

(Therapeutisches Centralblatt)