tui, fondit audacieux ra son coufendre. Du nis la blesn élan pour

camarade; r en temps gle étourdir Lake. Mes ment où je ter, dans le de bec forit, non pas protectrice

nent tombé , s'il n'avait : laquelle il alut.

visé l'aigle,
ue le læmtomber au
n émotion,
ène, apporforts de sa

itions pour it rendu le dans l'eau de brasses ais à terre, itoire dans

n perruque

de Grangeant, il est mort d'un coup de sang, à la chasse. Que le grand saint Hubert ait conduit son âme près de Dieu. notre souverain juge! C'est le vœu d'un ami qui ne l'a point oublié.

L'aigle des États-Unis, comme ses congénères d'Europe, vit rarement seul, et, suivant Audubon, le naturaliste célèbre dont la science regrette la mort prématurée, l'attachement mutuel des deux individus accouplés ensemble paraît durer depuis la première union jusqu'à la mort de l'un ou de l'autre individu. Les aigles chassent pour leur nourriture, de conserve, comme deux pirates associés, et mangent leur proie l'un à côté de l'autre. La saison de leurs amours commence dès le mois de décembre, et à ce moment le mâle et la femelle deviennent très-bruyants. On les voit voler ensemble, tournoyant dans l'espace, criant à pleins poumons, jouant, se battant même, mais pour rire, puis allant se reposer sur les branches sèches d'un arbre où tous les deux ont préparé la première couche de leur nid. Peutètre même ne font-ils que réparer celui de la dernière ponte. L'incubation commence dans les premiers jours de janvier. Le nid se compose de bâtons d'un mètre de longueur environ, de lambeaux de gazon, de plaques de mousse lichen, et il mesure, une fois terminé, un périmètre de cinq à six pieds. Les œufs que l'aigle femelle dépose dans ce buisson informe, au nombre de deux, trois, et quelquefois, mais rarement, de quatre, sont d'un blanc verdâtre à écaille granuleuse également arrondis aux deux extrémités. L'incubation dure environ de trois à quatre semaines.

Lorsque les aiglons éclosent, ils sont couverts d'un duvet roussatre, et ont le bec et les pattes d'une longueur démesurée. Leurs parents ne les expulsent de l'aire que lorsque leur plumage est complet et qu'ils peuvent voler. Mais avant ce moment décisif, où ils introduisent leur progéniture dans la société, les aigles les ont abondamment pourvus de gibier de toute sorte, ce qui fait que les lèvres du nid sont recouvertes de lambeaux de charogne puante, d'os et de fiente.