

TRAVAUX ORIGINAUX

PÉRITONITE SEPTIQUE GÉNÉRALISÉE CONSÉCUTIVE À L'APPENDICITE

ET

SON TRAITEMENT CHIRURGICAL.

Par le Dr D. MARSIL, de St-Eustache.

*Lu devant l'Association Médicale du Canada, réunie à Québec, à la séance
du 18 août 1898.*

Le traitement chirurgical de cette redoutable affection est de date relativement récente.

C'est en 1893 que Berger, de Paris, opéra pour la première fois pour cette grave maladie jusque là réputée incurable.

Il fut malheureux dans ses premiers essais ; il ne se découragea point cependant, et revint hardiment à la charge.

En 1894, il traitait chirurgicalement un jeune homme de 22 ans qui souffrait d'appendicite et de péritonite généralisée depuis trois jours. Il n'hésita point à ouvrir l'abdomen aux aines droite et gauche et aussi à la ligne blanche. Il fit, par ces trois ouvertures, l'irrigation du péritoine. Il est resté convaincu qu'il devait son succès à ce lavage.

Il rapporta ce cas à la Société Chirurgicale de Paris, le 22 juillet 1894.

L'année précédente, (1893), Reichel, interprète de l'Ecole allemande, exprimait l'opinion que dans le cas d'infection péritonéale, l'intervention opératoire était inutile et contre-indiquée quand la péritonite est généralisée ; que l'opération n'a sa raison d'être que quand la collection purulente est circonscrite par cloisonnement fibreux.