Le lendemain du jour où le malade a bien voulu se soumettre à notre examen, nous procédons nous même à l'analyse de son urine.

Opérant sur la quantité émise dans les 24 heures écoulées (1850 grammes), nous obtenons les résultats suivant :

Couleur rouge jaune (la 5^e de l'échelle Vogel) ;

Aspect : trouble ;

Consistance : fluide, mais légèrement onctueuse au toucher ;

Odeur : légèrement musquée ;

Réaction : acide ;

Densité : 1025 (toutes corrections de température opérés).

Traitée par la potasse à chaud, elle accuse l'existence du sucre dont le dosage, fait à l'aide de la liqueur de Pheling, nous donne le chiffre de 10 grammes par litre.

Nous soumettons immédiatement le malade au traitement dosimétrique classique de la glycosurie :

1^o Matin et soir, au lever et au coucher, 2 doses de la triade : *Aconitine, Digitaline, Arséniate de strychnine* ;

2^o Immédiatement avant chacun des deux principaux repas, et ensemble également : 2 granules *quassine* ; 2 granules *arséniate de strychnine*, et 2 granules *arséniate de fer* ;

3^o Toutes les heures, et en dehors des repas, en une seule fois toujours : 2 granules *benzoate de lythine*, 2 granules *camphre monobromé*.

Sedlitz Abbott en lavages, tous les matins.

Régime diététique et hygiène du diabétique.

Cette médication a été scrupuleusement suivie pendant près de 30 jours.

Le 8 novembre, le malade, venu de nouveau à Marseille, nous fait sa deuxième visite. Les résultats de l'examen général sont des plus concluants : l'amaigrissement et la dynamique paraissent enrayés ; les fonctions digestives sont régulières ; la polydipsie et la polyurie ont totalement disparu. A ce moment l'urine, analysée comme précédemment, donne lieu aux constatations suivantes :

Couleur : jaune rouge (la 4^e de l'échelle de Vogel) ;

Aspect : très légèrement louche ;

Consistance : fluide ;

Odeur : presque normale ;

Réaction : acide ;

Densité : 1020 ;

Dosage du sucre, toujours au moyen de la liqueur de Pheling ; 2 GRAMMES par litre.

Je conseille de suivre encore, pendant au moins un mois, le même traitement.

A l'expiration de ce terme, notre malade vient nous voir une troisième fois. Il n'accuse plus aucun trouble ; l'état général est excellent, l'examen de l'urine, fait à ce moment, vient donner, tout en la confirmant, la raison de l'amélioration constatée : *le sucre y fait totalement défaut*.

La guérison paraît complète.

DR ISOARE.

LIBRAIRIE E. O. BEAUCHEMIN & FILS

256, 258, rue St-Paul, Montréal

MERCIER (GUSTAVE).— Guide pratique de l'analyse des urines. 1 v. in-12 relié percaline . . . \$1.00
 MÉRIC (H. DE.).— Dictionnaire des Termes de médecines français-anglais. 1 v. in-8, relié percaline . . . \$1.50
 MÉRIC (H. DE.).— Dictionnaire des Termes de médecines anglais-français. 1 v. in-8, relié percaline . . . \$2.00
 MRACEK-HUDELO. — Atlas-Manuel des maladies de la peau. 1 v. in-8, pleine reliure souple maroquin, avec 63 planches chromolithographiées et 89 planches noires . . . \$5.00

MANQUAT (DOCTEUR A.).— Traité élémentaire de Thérapeutique, de Matière médicale, et de Pharmacologie, 4^e éd. 2 forts vols, in-8, brochés . . . \$6.00
 ROGER (DOCTEUR JULES).— L'hygiène par l'hydrothérapie. 1 v. in-8, br. avec gravures, plans et cartes . . . 88c.
 COMBY (DOCTEUR JULES).— Thérapeutique et Prophylaxie des maladies des enfants. 1 fort volume in 8, broché, 3^e éd. \$4.50