

développement du rachitisme, mais ces troubles fonctionnels sont eux-mêmes les conséquences d'une alimentation défectueuse. Nous ne connaissons pas encore de médication spécifique du rachitisme. C'est une raison de plus d'opposer à cette maladie une prophylaxie fondée sur une notion irrécusable, celle du rôle prépondérant de l'alimentation artificielle des nourrissons dans le développement du rachitisme; prophylaxie dont l'efficacité est attestée par l'observation quotidienne.

TRAITEMENT OPERATOIRE DE LA STENOSE DU COL

PAR M. LE DOCTEUR POZZI

Ce traitement s'applique à certains cols petits, à orifice externe étroit. Le débridement du col n'a pas donné de bons résultats. La dilatation progressive, soit avec des bougies de Hegar, soit avec des lamineaires, n'aboutit qu'à des échecs, quand ces manœuvres ne donnent pas naissance à une infection utérine ou tubaire.

La stomatoplastie est employée avec plus de succès. L'opération de Schröder donne des résultats assez bons. Mais M. Pozzi a eu des mécomptes. Il a constaté la reproduction de l'atrésie après l'amputation du col. Aussi s'est-il décidé à faire une opération qu'il croit nouvelle et qu'il nomme l'"évidement commissural du col".

Il commence par faire une section bilatérale du col. L'incision doit porter très haut. On obtient ainsi deux valves: l'une antérieure, l'autre postérieure. De chaque côté de la muqueuse cervicale, il existe sur chaque tranche deux surfaces saignantes latérales correspondant aux incisions. Sur chacune de ces deux surfaces, on dissèque un lambeau prismatique. La muqueuse cervicale est respectée. Après avoir enlevé de chaque côté de la valve le lambeau prismatique, on suture au fil d'argent le bord externe de la muqueuse cervicale avec le bord externe de la surface avivée, c'est-à-dire on réunit la muqueuse vaginale. Plusieurs points sont placés de haut en bas, de chaque côté de la vulve. On répète les mêmes opérations sur la seconde valve. De cette façon, la surface cruentée bilatérale se réunit par première intention et il n'y a pas de réunion entre la lèvre antérieure et la lèvre postérieure. Le col est divisé latéralement et ressemble à un bec de canard.