

rent par les cuisses postérieures qui ne sont pas dentées; outre cela, les taches et anneaux sont ici formées par une pruinosité très dense, qui s'enlève par le frottement, tandis que chez le genre *Splomya* la coloration appartient aux téguments et ne peut par conséquent s'effacer.

Deux espèces rencontrées.

Abdomen avec trois ou quatre bandes d'égale largeur.

..... **bombylans.**

Abdomen avec bandes non d'égale largeur.....

..... **alternans.**

1. TEMNOSTOMA BOMBYLANS, Fabricius.

♂ ♀. Longueur, 9 à 11 mm. Face, d'un noir brillant; une pruinosité jaunâtre sur les côtés; front noir avec pruinosité jaunâtre sur les côtés. Antennes variant d'un jaune pâle à un rougeâtre foncé. Thorax noir, avec deux bandes médianes grisâtres, plus ou moins apparentes; une tache aux épaules, une bande sur les flancs, correspondant à une bande semblable sur le thorax, et une petite tache allongée, vis-à-vis chaque angle externe de l'écusson, jaune; écusson noir. Abdomen noir; les segments 2, 3, 4 et 5 portant chacun une large bande arquée. Pattes variables; les antérieures, noires; base des cuisses et des jambes, jaune; pattes intermédiaires, jaunes; les cuisses sont quelquefois noires, à l'exception de la base, et un anneau brunâtre est quelquefois apparent sur les jambes; pattes postérieures, jaunes; un anneau noir, de grandeur variable, sur les cuisses un autre anneau plus ou moins apparent, sur les jambes. Partie antérieure des ailes, brunâtre.

Montréal, Saint-Hilaire. Mai, juin.

2 TEMNOSTOMA ALTERNANS, Loew.

♂ ♀. Longueur, 12 à 15 mm. Face jaune; une bande au milieu, et les joues, noir; front, chez le mâle, jaune, avec