

Cette sous-famille ne renferme pas moins de 7 genres dans notre faune ; la clef suivante peut servir à les distinguer les uns des autres.

Bec court, fort, courbé dès la base, commissure légèrement concave ;

Ailes dépassant le milieu de la queue, 1ère primaire égale à la 2e..... 1. PINICOLA.

Ailes atteignant à peine le tiers de la queue ; 1ère primaire beaucoup plus courte que la 2e. 2. CARDINALIS.

Bec court, bombé au milieu et courbé à la pointe..... 3. CARPODACUS.

Bec à mandibules falciformes, souvent se croisant..... 4. CURVIROSTRA

Bec conique, droit, ou légèrement courbé à la pointe ;

Mandibule supérieure avec des lignes parallèles au bord extérieur ;

Doigt extérieur le plus long ; doigt postérieur plus long que son ongle..... 5. CHRYSOMITRIS

Doigt intérieur le plus long ; doigt postérieur plus court que son ongle..... 6. AEGIOTHUS.

Mandibule supérieure sans lignes ; mâchoire inférieure beaucoup plus large que la supérieure à la base..... 7. PLECTROPHANE

1. Gen. GROS-BEC. *Pinicola*, Vieillot.

Bec court, fort, se courbant dès la base ; mandibules à bords arrondis ; commissure légèrement concave jusque vers la pointe, où elle s'incline brusquement ; narines en partie cachées par de petites plumes qui couvrent une partie du bec. Ailes longues, dépassant le milieu de la queue ; 1ère primaire à peu près égale à la deuxième ; queue presque carrée. Tarses plus courts que le doigt médian.

Une seule espèce dans notre faune, et qui paraît identique avec celle du Nord de l'ancien continent.

Le Grosbec du Canada. *Pinicola Canadensis*, Cabanis. *Loxia enucleator* Wils. ; *Pyrrhula enucleator*, Aud.—Vul. *Le Grosbec des pins* : Angl. *The Pine Grosbeak*.—Longueur $8\frac{1}{2}$ pouces ; ailes $4\frac{1}{2}$; queue 4 pouces. Bec et pieds noirs. Couleur générale d'un rouge carmin, plus ou moins effacé sur le dos, mais brillant sur la tête ; la région des lores, tout le tour de la base de la mandibule inférieure, les