

Sepsie.—Pourriture, infection, condition de putréfaction.

Septicémie.—Empoisonnement du sang dû aux microbes pathogènes et à leur toxines.

Septique.—Portant à la putréfaction ou produit par elle.

Sérum.—Fluide incolore qui se sépare du caillot sanguin. C'est le plasma privé de sa fibrine. Le sérum des animaux préalablement inoculés de bactéries ou de leur toxine est employé pour inoculer les êtres humains, afin de les immuniser contre certaines maladies infectieuses.

Séton.—Bande de gaze passée dans une blessure afin de garder une ouverture pour l'issue des liquides de la suppuration.

Sonde.—Instrument grêle qu'on introduit dans une plaie ou une partie quelconque dans un but d'exploration, ou pour passer un fil, tampon, etc.

Sonde cannelée.—Instrument portant une gouttière pour guider la pointe des instruments tranchants en chirurgie. Souvent combinée avec un autre instrument comme un cure-oreille, crochet, etc.

Sous-cutané.—En dessous de la peau.

Spasme.—Contraction musculaire rigide. (Voir convulsion).

Spatule.—Instrument plat employé pour mêler les onguents.



étendre un cataplasme ou abaisser la langue.

Spinal, canal.—Cavité entourée par des prolongements des vertèbres. Elle s'étend sur toute la longueur de l'épine dorsale et contient la moëlle épinière.

Splanchnique.—Qui concerne les viscères.

Sporadique.—Ne présentant que quelques cas; l'opposé du mot épidémique.

Squelette.—La charpente du corps.

Stérile.—Exempt de germes. Aseptique.

Sternum.—Os conformé en dague et situé en avant du thorax.

Stertor.—Respiration accompagnée d'un ronflement particulier, ou plutôt le ronflement lui-même.

Stupeur.—Insensibilité plus ou moins complète. Le patient peut avoir un peu conscience, ou peut être totalement inconscient, ou dans le coma.

Sueur.—Liquide clair sécrété des tissus et sortant par les pores de la peau. Transpiration. (Voir évaporation).