

Granules Composés de CHARLES CHANTEAUD

EN BOITES DE 5 TUBES DE 20 GRANULES

Leur composition et leur mode d'emploi dans les principales maladies des adultes

I. — Granules défervescents antifébriles (4 fr. la boîte)

COMPOSITION	ACTION	APPLICATION	DOSES
Arséniate de strychnine , 1/2 milli.	Régularisent les battements du cœur et la pression sanguine ; décongestionnent les viscères hémorragiques, et abaissent la température du corps.	S'emploient comme <i>dominante</i> dans les fièvres à la période de chaleur, dans toutes les maladies fiévreuses, quand la température dépasse 38 degrés et dans tous les états congestifs.	Chez les adultes, un granule toutes les ½ heures.
Digitaline amorphe , 1 milli.			
Aconitine amorphe , 1/2 milli.			

II. — Granules fébrifages et antipériodiques (5 fr. la boîte)

Sulfate de quinine , 0,05 Arseniate de strychnine , 1/2 milli. Caffeïne , 1 milli.	Détruisent la périodicité des accès ; s'opposent au retour de la fièvre, et relèvent la vitalité.	S'emploient comme <i>dominante</i> dans les fièvres tertiliaires ou paludées et dans les fièvres larvées, pendant le stade de froid et de frisson. On y joint, comme <i>variante</i> , le Sulphydral et le Sel de Sedlitz .	Un granule toutes les ½ heures, jusqu'à réaction.
---	---	---	---

III. — Granules antizymotiques (4 fr. la boîte)

Brucine , 1/2 milli. Hydro-ferro-cyanate de quinine , 1 centi. Aconitine , 1/2 milli.	Coupent la fièvre et font disparaître ses diverses manifestations : courbature, mal de tête, etc., tonifient et remontent les malades.	S'emploient comme <i>variante</i> dans les maladies infectieuses, grippe épidémique, érysipèle, typhus, variole, etc., ou le Sulphydral , antibacillaire, est donné à doses élevées comme <i>dominante</i> .	Un granule toutes les ½ heures dans les cas aigus, puis toutes les heures, puis toutes les deux heures.
--	--	---	---

IV. — Granules reconstituants antistrumeux (3 fr. la boîte)

Iodoforme , 1 milli. Phosphate de fer , 1 centi. Quassine , 1 milli.	S'opposent à la prolifération des microorganismes pathogènes, augmentent la crise sanguine, fortifient le squelette et activent les fonctions gastro-intestinales.	Comme <i>dominante</i> dans toutes les maladies de l'enfance qui sont sous la dépendance d'un vice de sang : gouttes, glandes, gros ventres, tumeurs blanches, abcès osseux, etc.	Trois à six granules par jour, selon l'âge.
---	--	---	---

V. — Granules antidiathétiques (4 fr. la boîte)

Arseniate de strychnine , 1/2 milli. Hcléonine , 1 centi. Tauzin , 1 centi.	Arrêtent la déchéance vitale, détruisent le virus tuberculeux et modifient la sécrétion bronchique.	Comme <i>dominante</i> dans la phthisie pulmonaire en même temps que le Sulphydral , 10 à 12 granules par jour. Comme <i>variante</i> , granules défrévescents contre la fièvre, et granules expectorants, soir et matin, pour vider les bronches.	Quatre à huit granules par 24 heures.
--	---	--	---------------------------------------

VI. — Granules contre le diabète sucré (4 fr. la boîte)

Arseniate de strychnine , 1/2 milli. Arseniate de fer , 1 milli. Benzonate de lithine , 2 centi. Quassine , 1 milli.	Relèvent la vitalité, augmentent la crise sanguine, excitent la fonction du foie, corrigeant l'acidité des urines.	Comme <i>dominante</i> dans la glycaturie d'origine trophique, le diabète compliqué d'albuminurie.	Trois granules par jour : un avant chaque repas. Dans les cas graves, doubler les doses.
---	--	--	--

VII. — Granules contre le diabète nerveux (4 fr. la boîte)

Bromhydrate de cicutine , 1/2 milli. Hyoscyamine , 1/4 de milli. Campfire mono-bromé , 1 centi.	Apaisent les accidents nerveux du diabète. Donnés préventivement, à petites doses, ils s'opposent à toute manifestation pénible du système nerveux.	Puissent servir de <i>dominante</i> ou de <i>variante</i> , suivant l'intensité des accès : spasmes, étouffements, tremblements, vertiges, etc. Peuvent servir de <i>variante</i> , tandis que les granules précédents sont donnés comme <i>dominante</i> .	Trois à six granules par jour, dans l'intervalle des repas. En cas de crises aiguës, un granule toutes les ½ heures.
--	---	---	---

VIII. — Granules antinévralgiques (5 fr. la boîte)

Valriamate de quinine , 0,02 centi. Aconitine amorphe , 1/2 milli. Hyoscyamine , 1/10 milli.	Calment la douleur, empêchent le retour des accès.	Dans les crises douloureuses des névralgies faciales, intercostales, sciatiques et autres.	Un granule toutes les ½ heures ou toutes les heures, suivant la force du mal, jusqu'à effet calmant.
---	--	--	--

IX. — Granules contre les spasmes douloureux (4 fr. la boîte)

Arseniate de strychnine , 1/2 milli. Hyoscyamine , 1/4 milli. Chlorhydrate de morphine , 1 milli.	Rétablissement l'équilibre physiologique détruit par les spasmes (contractures, relâchement des sphincters), facilitent le travail des accouchements.	Crampes d'estomac, coliques sèches, tranchées utérines, rétention d'urine, dysplasie, vomissements incohérents, etc., etc.	Un granule tous les ½ d'heures pendant les crises, jusqu'à effet.
--	---	--	---

X. — Granules antinausiques contre le mal de mer (5 fr. la boîte)

Sulfate de strychnine , 1/2 milli. Hyoscyamine , 1/4 milli. Bromhydrate de morphine , 1 milli.	Réfrérent les contractions spasmodiques de l'estomac et régularisent la circulation du cerveau anémisé par le vertige du tangage.	Comme <i>préventif</i> avant de s'embarquer sur mer. Comme <i>curatif</i> pendant les malaises et les vomissements.	Un granule tous les ½ d'heures jusqu'à disparition des vertiges et des nausées.
---	---	---	---