

Fruits, probablement de *Ginkgo*.

*Sphenolepidium sternbergianum rensiyorum*, Heer.

*Ginkgo lepida*, Heer.

*Ginkgo sibirica*, Heer.

*Ginkgo*, sp., inflorescence male.

*Athrotaxopsis tenuicaulis*, Font.

*Nilsonia californica*, Font.

*Ginkgo huttoni*, Heer.

*Thyrsopteris brevipennis*, Font.

Dans la formation Kootenay—

*Dryopteris fredericksburgensis* (Font.), Knowlt.

*Cycadites longifolius*, Font.

*Sagenopteris mantelli* (Dunk.), Schenk.

*Athrotaxopsis tenuicaulis*, Font.

*Sagenopteris* n. sp.

*Thyrsopteris meekiana*, Font.

*Sequoia heterophylla*, Heer.

*Sequoia smittiana*, Heer.

*Sagenopteris elliptica*, Font.

*Baicropsis pluripartita*, Font.

*Podozamites longifolius*, Emmons.

*Podozamites lanceolatus* (L. and II.), Schimp.

*Thyrsopteris insignis*, Font.

*Thyrsopteris pecteroideus*, Font.

*Cladophlebis falcata*, Font.

*Zamites arcticus*, Gopp.

*Ginkgo huttoni magnifolia*, Font.

*Cladophlebis constricta*, Font.

*Nilsonia*, a. sp.

*Cladophlebis distans*, Font. (?)

Quelques types trouvés dans la formation Belly-River ont été considérés par quelques autorités comme appartenant au Dakota.