

TRAVAUX ORIGINAUX

Hystéropexie abdominale antérieure ;

par le docteur O. F. MERCIER, de Montréal, (Canada).

Grâce à l'antisepsie, le domaine de la chirurgie s'élargit sans cesse. Que d'opérations sont aujourd'hui de pratique courante, et qu'il y a quelques années on osait à peine tenter. Encore fallait-il que le chirurgien eût la main forcée ; d'opérations dites de complaisance on n'en connaissait guère. Aujourd'hui il n'en est plus ainsi, la cavité péritonéale même est ouverte sans crainte ; en effet la laparatomie, naguère si meurtrière, ne donne plus qu'une mortalité insignifiante. Aussi le chirurgien, en présence d'un diagnostic qu'il ne peut faire, ne craint pas de pratiquer la laparatomie exploratrice, car il sait que c'est une opération devenue inoffensive, et qui ne donne presque aucune mortalité.

Les déviations utérines ont profité de ce progrès, et non satisfait des résultats des différents procédés qui servaient au redressement utérin, non satisfait des succès que semblait devoir fournir l'opération d'Alexander, on ouvre aujourd'hui le péritoine, et l'on va suturer le corps même de la matrice à la paroi abdominale antérieure, que l'on referme. C'est là l'hystéropexie abdominale antérieure.

C'est en 1869 que cette opération fut pratiquée pour la première fois, par Koeberlé, le célèbre chirurgien de Strasbourg. Quoique le succès couronnât son expérience, son exemple ne fut pas suivi de longtemps. Koeberlé l'avait faite de parti pris, et n'avait pas craint de pénétrer dans la cavité abdominale à cette seule fin de fixer l'utérus dévié.

Ce ne fut qu'en 1875 qu'elle fut de nouveau pratiquée, cette fois par M. Sims, au cours d'une laparatomie pour lésions des annexes. Dès lors l'opération fut créée de toutes pièces, et le peu de changement dans sa technique actuelle est dû à des modifications de détails.

Koeberlé et M. Sims furent imités en 1878 par Schroed r. Elle fut ensuite pratiquée plusieurs fois, tant en Allemagne et en Angleterre qu'aux Etats-Unis. Ce n'est que dix ans plus tard, en 1888, qu'elle fut de nouveau introduite en France par Terrier. Elle est maintenant d'un usage fréquent. Beaudoin, dans sa thèse magistrale de 1890, nous en apporte plus de deux cent trente observations, dont environ soixante-deux typiques et le reste complémentaires. Je l'ai vue moi-même mise en pratique plusieurs fois depuis mon séjour à Paris.