lé près d'une femme pour laquelle l'avortement ou l'accouchement prématuré est une habitude, vous aurez tort, si vous ne faites pas figurer l'infection syphilitique parmi les causes supposables dont on dresse le catalogue provisoire avant d'asseoir son jugement." La répétition des avortements sans cause manifeste peut devenir un signe révélateur de la syphilis et Depaul et Fournier, devant ces avortements, se croient autorisés à employer le traitement spécifique dont les résultats sont bien souvent concluants.

Les avortements peuvent se répéter un nombre de fois considérables, six avortements ne sont pas un fait exceptionnel. Fournier rapporte l'observation d'une femme qui avorta 9 fois et il rapporte aussi celle d'une femme qui eut 10 avortements ou accouchement prématurés successifs et dont le 11ème accouchement se termina à terme par la naissance d'un enfant syphilitique qui mourut au bout de 4 jours.

Que l'avortement dépende de lésions utéro-placentaires ou soit causé par le fœtus lui-même, son mécanisme est toujours le même : la femme sent diminuer de jour en jour les mouvements du fœtus, ils finissent bientôt par cesser complètement et les troubles sympathiques de la grossesse qui pouvaient exister jusqu'à ce moment disparaissent alors. Le ventre s'affaisse, les seins s'amointrissent, il y a pesanteur dans les lombes et dans le bas-ventre et une sensation d'un corps inerte placé dans l'utérus qui se déplace lorsque la femme fait un mouvement et qui obéit aux lois de la pesanteur. Les douleurs utérines se déclarent bientôt et tout se passe comme pour l'avortement ordinaire.

I OBSERVATION. (Porak)

G..... 35 ans, syphilis contractée à 17 ans de son premier mari dont elle n'a eu ni enfant ni fausses couches... plaques muqueuses etc., remariée à 20 ans, ne contagione pas son mari ; 10 fausses couches successives, aucun des enfants n'a survécu, la dernière date de 3 ans, 11ème grossesse à terme, la mère se porte très bien et ne présente aucune manifestation spécifique, elle accouche d'un enfant qui pèse 2. 555 grammes et qui, né sans lésion, présente le 2ème jour une éruption papuleuse qui va en s'accroissant à la face et au palais. Au bout de quelques jours, apparition de larges bulles de pemphigus sur la joue gauche à aspect hémorragique, mort le lendemain.

II OBSERVATION. (Personnelle)

Femme X..... bassin norm. l, multipare. Le début de la syphilis inconnu..... aucun traitement, céphalalgies très intenses.

1er avortement en 1884 à 6 mois. 2ème accouchement prématuré, en 1885, à 7 mois. 3ème avortement en 1886, à 3 mois. 4ème accou-