noires à la base et en dessous. Abdomen robuste, distinctement ponctué, le premier segment avec une double tache sinuée, les 2 suivants avec des taches ovales et les 3 suivants avec une bande continue, celle du 6e souvent obsolète au milieu.

♀—Tête cubique, légèrement rétrécie en arrière; métathorax presque lisse, finement strié; abdomen avec 3 paires de demi-bandes jaunes et 2 bandes complètes, les taches du 1er segment plus larges en dedans; l'extrémité noire avec poils dorés.

Espèce bien remarquable par la forme de ses antennes. La ♀ de notre spécimen n'a qu'une seule tache jaune sur les flancs.

8. *Crabron à-front-noir*. *Crabro nigrifrons*, Cress. Proc. Ent. Soc. Phil. vi, p. 482 ♂.

♂—Long. .38 pce. Noir; le scape des antennes, 2 taches sur le prothorax, les tubercules, une ligne sur le post-écusson, les pattes en partie, avec 4 paires de taches et 2 bandes continues sur l'abdomen, jaune pâle. Tête en carré, les orbites avec le chaperon argentés; les mandibules noires, sans taches. Antennes avec le scape jaune portant une strie noire en dessus, le pavillon avec 4 dents en dessous. Le prothorax avec une petite ligne jaune de chaque côté. Le mésothorax avec l'écusson finement ponctué, le post-écusson avec une petite ligne jaune; le métathorax fortement rugueux, sa face supérieure séparée de la postérieure par une petite carène. Ailes légèrement enfumées, les nervures noires. Les cuisses antérieures roussâtres avec une strie noire en dedans, les intermédiaires noires, jaunes à l'extrémité avec une strie jaune en dessus et roussâtre en avant, les postérieures totalement noires; toutes les jambes jaunes, noires en arrière; les tarsi jaun-brunâtre, les postérieurs plus foncés. Abdomen subpédonculé, poli, convexe, renflé en dessous, les 4 premiers segments avec une paire de taches jaunes allongées, celles du 2e segment plus larges et plus rapprochées, les segments 5 et 6 avec une bande continue, l'extrémité noire avec poils roussâtres.

Capturé à Chicoutimi. Un spécimen a le pavillon des antennes roussâtre en dessous et manque de taches sur le premier segment abdominal.

9. *Crabron singulier*. *Crabro singularis*, Pack. Proc. Ent. Soc. Phil. vi, p. 86, ♂ ♀.

♀—Long. .55 pce. Noir foncé; les mandibules excepté à l'extrémité, le scape des antennes, une tache de chaque côté du milieu du