

4^o Dans la toux chronique, le remède s'administre le matin et le soir ; quelquefois dans le jour, s'il y a lieu ;

5^o Les résultats sont ordinairement excellents ; ce médicament n'exerce aucune influence fâcheuse sur l'estomac ; il est même très-utile contre les nausées et les mauvaises digestions. (*New-York med. Rec. et Cbl. fur klin. medicin.*—*Lyon Médical.*)

PATHOLOGIE ET CLINIQUE CHIRURGICALES.

Procédés simples permettant de remplir les indications principales de la méthode antiseptique.—*Acide phénique.*—*Pansement des plaies, des abcès des accouchées.*—*Substances antiseptiques diverses :* par le docteur J. Lucas Championnière, chirurgien de la Maternité, de l'hôpital Cochin.

Nous avons assez souvent parlé du pansement de Lister ici, pour que le lecteur sache très bien que le sujet est trop long à exposer dans un journal. Notre manuel sur la matière est aussi court qu'il est possible et nous y renvoyons pour l'étude de cette chirurgie qui s'impose, à laquelle viennent tous, les uns après les autres, vaincus par l'évidence, les chirurgiens même les plus hostiles au début ; ils trouveront, là seulement, les indications pour appliquer correctement la méthode et en tirer tous les bénéfices.

Mais il peut arriver que cette application correcte soit rendue impossible par le manque de ressources, par l'absence de pièces de pansement. On peut alors, en se souvenant des préceptes de la méthode, avec un emploi de moyens antiseptiques simples, obtenir les résultats principaux, sécurité et réduction à peu de chose de la suppuration.

Beaucoup de nos lecteurs nous ayant demandé de les guider dans cette voie, nous avons réuni dans le présent article les formules indispensables et l'indication des procédés à employer.

Avec ces moyens ils auront déjà fait faire à leur pratique un progrès immense dont leurs malades leur seront reconnaissants.

Tout d'abord il faudra exclure de leur pratique toutes les substances déjà putréfiées comme les cataplasmes, toutes les substances putréfiables, les graisses rancies, et l'eau pure qui transporte les germes et qu'il est facile de remplacer par une