

l'injection d'iode nous reviendra d'ici à quatre ou six mois. Voilà bien un cas typique, heureusement ce sont les plus nombreux.

Reprenons à nouveau ces symptômes et voyons-en les variantes :

*La tumeur présente à peu près le volume des deux poings.* — Malgré la tunique fibreuse qui double en dehors la vaginale et la supporte, celle-ci est susceptible d'une distension énorme puisqu'il n'est pas rare d'y voir s'accumuler plusieurs livres de liquide. Dans ces cas la peau du scrotum ne pouvant suffire à la distension celle de la verge est mise en réquisition, " en sorte que le pénis disparaît et est pour ainsi dire englobé dans la tumeur. L'orifice du prépuce se montre alors sous l'apparence d'une dépression plus ou moins enfoncée de la peau du scrotum qui rappelle la cicatrice ombilicale. " (1)

*Elle est lisse* — Dans certains cas, assez rares du reste, la vaginale, sous la poussée de son contenu, peut faire hernie à travers la fibreuse qui s'éraïlle, et donner à la tumeur une apparence bosselée qui heureusement ne gêne en rien le diagnostic qu'éclaircit toujours la rénitence, la fluctuation et la transparence.

*Elle est pyriforme, ovoïde, presque arrondie*; elle s'effile en haut sur le cordon spermatique, mais elle peut être bilobée ou en bissac. La bilobée est due à une distension inégale de la fibreuse qui donne quelquefois à la tumeur la forme d'un sablier. Il ne faut pas confondre cette variété avec l'hydrocèle *en bissac*, qui au lieu de se limiter dans la bourse au dessous de l'anneau inguinal externe, se prolonge dans le canal inguinal et quelquefois jusque dans la fosse iliaque en refoulant le péritoine, formant une tumeur allongée et étranglée par l'anneau inguinal externe; la fluctuation se transmet d'une cavité à l'autre. Dans la station verticale, la tumeur scrotale grossit aux dépens de l'inguinale, tandis que dans le décubitus dorsal c'est le contraire qui a lieu.

*Elle est rénitente, fluctuante et mate.* — La rénitence et la fluctuation peuvent dans certains cas être obscurcies par la grande quantité du liquide qui donne à la tumeur une dureté considérable, mais un doigt exercé s'y laissera bien rarement tromper. Quant à la matité, elle ne varie jamais.

*Elle est irréductible*, caractère qui, associé à la matité, est d'un précieux secours pour la distinguer de la hernie; toutefois, il faudra tenir en mémoire qu'elle est réductible *partiellement* par la position et la compression dans l'hydrocèle *en bissac*, et complètement dans la congénitale, mais dans ces deux cas la réduction s'opère *sans gargouillement*.

*Elle est transparente.* — Pour constater cette transparence on se sert de différents moyens. On place le malade dans une chambre