

New-York vient d'ouvrir un dépôt dans l'Edifice Dandurand angle des rues St-Denis et Ste-Catherine, Montréal.

Cette compagnie désire attirer l'attention de la Profession Médicale particulièrement sur les deux préparations du Laboratoire Viel de Paris : Iodeol et Iodargol. Ces préparations possèdent à la fois les propriétés de l'Iode et celles résultant de l'état colloïdal, ce qui fait qu'elles sont des antiseptiques et des bactéricides très puissants, et ceci a été trouvé par des recherches cliniques. A cause de leur grande facilité d'absorption elle pénètre dans les plus petites ramifications du système circulatoire sans provoquer aucune irritation, érythème ou sensation de brûlure.

Ces médicaments ont été très employés et ont donné d'excellents résultats dans le traitement de la tuberculose.

---

Le cathéter employé par une main inhabile ou non expérimentée est un instrument dangereux et avant de s'en servir dans des cas de rétentions d'urines, il vaut mieux recourir d'abord aux moyens palliatifs tels que bains de siège chauds, suppositoires de Belladone et d'Opium, injections rectales chaudes ou bien donner une cuillerée à thé de Sanmetto toutes les heures pendant trois ou quatre heures. Après le cathétérisme il est bon aussi de donner du Sanmetto pour faire disparaître l'irritation ou l'inflammation du canal urinaire.

