

une mortification, une nécrose du tubercule et du tissu péri-tuberculeux, tissu inflammatoire ; si ce processus peut favoriser l'élimination des produits et la guérison rapide, il n'en est pas moins vrai que dans certaines conditions il va à l'encontre du but qu'on veut atteindre et provoque une propagation et une dissémination du virus. Rien ne prouve que la lymphe favorise les processus induratifs, l'encapsulation fibreux de masses caséuses. Au contraire, tout porte à croire que les injections mobilisent en quelque sorte les masses encapsulées et rendent dangereux les foyers qui, au moins, n'étaient plus nuisibles pour l'économie."

Prophylaxie de la diphtérie.

Dans un mémoire présenté au Comité d'Hygiène de France au sujet des mesures à prendre pour empêcher la propagation de la diphtérie, M. le professeur Grancher préconise les moyens suivants qu'il met, du reste, en pratique tous les jours dans son service aux *Enfants Malades* :

1o Il faut pratiquer à l'aide de l'eau bouillante, chargée de carbonate de soude à 50 grammes par litre d'eau, la désinfection immédiate des objets qui ont servi au diphthérique ou qu'il a touchés, notamment de tout ce qui a servi à son repas : timbale, couteau, fourchette, serviette, etc. ;

2o. Il faut que les médecins et les infirmiers protègent leurs vêtements par une blouse rigoureusement désinfectée à l'étuve après la visite de chaque jour, et qu'ils aient la précaution de se laver minutieusement les mains au sublimé acide ou à la solution phéniquée à 5 p. 100 et glycinée ;

3o. Il faut que tout objet transportable à l'étuve à vapeur sous pression y soit désinfecté, la literie, les draps et les vêtements notamment. Tous les objets non transportables, ainsi que le sol et les murs de la chambre à coucher d'un diphthérique seront lavés au sublimé.

Nous doutons fort que les médecins appelés à donner leurs soins aux sujets atteints de diphtérie prennent toujours toutes les précautions précitées. Nous en connaissons qui affectent de ne pas croire au caractère contagieux de la maladie, histoire de s'exempter du soin de faire de la prophylaxie antiseptique. Les mesures à prendre sont cependant des plus simples, comme on a pu le voir, et se résument, en somme, à des soins d'extrême propreté.

Au reste, la nature éminemment contagieuse de la diphtérie