

si peu de confiance, car mon expérience assez étendue ne m'en dit rien de bon, que je n'ose y avoir recours. Je veux essayer un traitement plus énergique et dont on a vanté les effets. Je vais essayer pour la première fois de produire un abcès artificiel ou abcès fixateur ou dérivatif.

Ces abcès peuvent se produire avec différentes matières: par les injections hypodermiques de quinine ou de térébenthine. Comme je n'avais pas sous la main cette dernière substance, j'injectai 5 grs de sulfate de quinine dans la fesse gauche.

21 décembre, 5 hrs a.m., température 105°, pouls 120; 9 hrs a.m., température 105°, pouls 120.

La malade va de mal en pis. Tout espoir est perdu. Cependant la malade boit encore une bonne quantité de lait et je lui prescris la potion suivante dont elle prend une cuillerée à soupe toutes les deux heures: cette formule est continuée tous les jours suivants jusqu'à la convalescence:

|   |                                |             |
|---|--------------------------------|-------------|
| R | Extrait de quinquina . . . . . | 1 drachme   |
|   | Teinture de cannelle . . . . . | 2 drachmes  |
|   | Sirop d'orange . . . . .       | 1 once      |
|   | Vin rouge . . . . .            | } à 2 onces |
|   | Cognac . . . . .               |             |

M. — La quinine est continuée toutes les 4 heures. J'injecte dans le flanc (sans prendre aucune précaution antiseptique, dans le but de créer le plus tôt possible un abcès quelconque) 20 centimètres cubes de sérum de Marmoreck, et dans la fesse gauche je fais une injection hypodermique de 6 gouttes d'essence de térébenthine.

6 hrs p.m., température 105°, pouls 120. Comme on le voit le sérum de Marmoreck n'a produit aucun effet salulaire.

Je ne me décourage pas, je répète le sérum à dose de 20 c.c., et la térébenthine à dose de 10 gouttes. Je cesse l'emploi de quinine et je reprends les paquets d'antikamnia, etc., pour trois doses seulement, vu ses effets rapides sur le cœur et de suite je constate une diminution marquée de la température qui s'élève de nouveau quand on cesse ces médicaments. C'est ainsi qu'à 6, 8 et 10 hrs p.m., l'antikamnia, l'antifébrine et le calomel sont administrés et qu'à 10 hrs p.m., la température est 102° et le pouls 106.

22 décembre, 2 hrs a.m., température, 103°, pouls 108; 7 hrs a.m., température 104°, pouls 104.