

lire prit fin. Le malade allait-il guérir et présenter un abcès de fixation par où s'élimineraient les germes infectieux ? Il n'y avait guère d'espoir à conserver sur ce sujet. Dans la streptococcie, s'il se forme des abcès, c'est plutôt sous forme de phlegmon diffus qui ne fait qu'aggraver l'état du patient. Et c'est bien ainsi que les choses se passèrent. Le sang montra une hypoglobulie (3 millions de globules rouges) avec hyperleucocytose (24.000 leucocytes) et polynucléose, signe de suppuration manifeste. Successivement, on vit se produire un phlegmon diffus du bras gauche, de la cuisse gauche, de l'avant-bras gauche, de la cuisse droite. L'incision de tous les foyers malades n'empêcha pas les symptômes graves de reparaître et de se précipiter : délire et diarrhée se montrèrent à nouveau et le malade succomba, ne présentant à l'autopsie, outre les foyers constatés du vivant, qu'une hypertrophie légère avec début de sclérose du foie, tenant sans doute à certaines habitudes alcooliques du sujet.

La streptococcie présentée par le malade peut revêtir des formes différentes et reconnaître des portes d'entrée diverses.

Une femme de 46 ans, opérée d'une tumeur du sein et ayant subi un curettage à l'aisselle, fut prise, à sa sortie de l'hôpital, d'un violent frisson. Elle venait de panser sa plaie opératoire avec un morceau de diachylon malpropre. Les bords de la plaie se rouvrirent, s'entourèrent, cette fois, d'un bourrelet érysipélateux très net. La malade, très dyspnéique, montra une matité pleurale due à la présence d'un liquide séro-purulent qui devint purulent très vite.

Au niveau du cubitus, il se développa une plaque rouge indurée rappelant la forme de l'érythème noueux. Les articulations sterno claviculaire, tibiotarsienne, le genou se tuméfièrent ; les deux parotides se prirent également et la malade succomba dans le collapsus. La culture du sang, opérée dans le service de M. Oettinger, avait, dès les premiers jours, montré du streptocoque à l'état de pureté. Quant au traitement, il avait consisté dans des injections répétées de sérum antistreptococcique de Marmorek aux doses de 20 cc.