

Ferme expérimentale de Nappan.

BETTERAVES FOURRAGÈRES.

Il a été essayé à Nappan en 1907 dix variétés de betteraves fourragères. Elles ont été semées en rangs espacés de deux pieds et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à être à intervalles de 10 à 12 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 17 juin, et l'arrachage des racines le 26 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.		Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.	
		ton.	lb.	ton.	lb.		ton.	lb.	ton.	lb.
	(Cinq ans.)						(Moins de 5 ans.)			
1	Yellow Intermediate	33	124	36	1,425	Mammoth Red Intermediate				
2	Giant Yellow Intermediate	32	468	38	1,385	(1 an)	26	1,295	26	1,295
3	Half Sugar White	29	1,895	31	1,525	Crimson Champion (1 an)	26	800	26	800
4	Prize Mammoth Long Red	29	1,019	32	1,175	Perfection Mammoth Long				
5	Selected Yellow Globe	28	1,303	28	925	Red (1 an)	25	1,480	25	1,480
6	Giant Yellow Globe	27	1,505	27	450					
7	Gate Post	25	704	36	690					

Le rendement moyen des dix variétés de betteraves fourragères essayées à la ferme expérimentale de Nappan en 1907 a été 28 tonnes 1,059 lb. par acre.

CAROTTES.

Il a été essayé à Nappan en 1907 six variétés de carottes des champs. Elles ont été semées en rayons espacés de deux pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de manière à être à intervalles d'environ 4 à 5 pouces dans les rangs. Le semis a eu lieu le 15 juin, et l'arrachage des racines le 26 octobre.

Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.		Numéro.	Variétés essayées.	Produit moyen.		Produit en 1907.	
		ton.	lb.	ton.	lb.			ton.	lb.	ton.	lb.
	(Cinq ans.)						(Cinq ans.)				
1	Ontario Champion	19	423	17	815	4	Half Long Chantenay	17	73	16	505
2	Giant White Vosges	18	780	15	30	5	White Belgian	16	1,823	14	50
3	Mamm White Intermediate	18	452	14	1,700	6	Improved Short White	16	906	16	845

Le rendement moyen des six variétés de carottes à la ferme expérimentale de Nappan en 1907 a été 15 tonnes 1,322 lb. par acre.

BETTERAVES À SUCRE.

Il a été essayé à Nappan en 1907 trois variétés de betteraves à sucre. Elles ont été semées en rayons espacés de douze pieds, et les jeunes plantes ont été éclaircies de