de chemin de fer et qui avait été amené presque exsangue à Bellevue hospital. Le pouls se releva rapidement et le patient put supporter une apputation de cuisse, singulièrement facilitée du reste par le procédé exsanguificateur d'Esmarch. (The Clinic.)

TRAITEMENT DU CORYZA PAR LE PERCHLORURE DE FER.—Le docteur Prout, de Brooklyn, conseille chaudement la formule suivante dans le traitement du coryza et du catarrhe frontal:

Teinture de chlorure de fer. Glycérine......ââ.

A prendre une cuillerée à thé dans une verrée d'eau froide. On peut répéter cette dose suivant les circonstances. La glycérine masque en partie le goût du fer. Ce mélange est bien supporté et a une légère action diurétique. (New York med. Record.)

DE L'ERGOT DE SEIGLE DANS L'ÉPISTANIS.—Le docteur Andrew H. Smith rapporte dans le New York med. Record l'histoire d'un homme de 37 ans, atteint d'une épistaxis grave, sans lésion apparente de la pituitaire, qui avait résisté à tous les astringents internes et externes ; il administra alors l'extrait liquide d'ergot de seigle à la dose de vingt gouttes trois fois par jour. L'hémorrhagie diminua dès la première dose et disparut au bout de dix jours. On discontinua le traitement et l'épistaxis reparut. La reprise du médicament suffit à arrêter encore une fois l'écoulement. L'ergot fut continué environ pendant un mois à doses progressivement décroissantes et la guérison fut complète. (The Clinic.).—Lyon Médical.

GUÉRISON DES TACHES DE ROUSSEUR.—Du nitre en poudre humecté d'eau et appliqué sur la face le matin et le soir suffit pour faire disparaître cette petite affection cutanée si ennuyeuse chez les jeunes personnes. (The Practitioner)

Poudre absorbante.

 Magnésie calcinée
 2 grammes
 3ss

 Bi-carbonate de soude
 4
 —
 3i

 Craie préparée
 5
 —
 3i grxv

 Sucre pulvérisé
 10
 —
 3iiss

Mêler et diviser en dix paquets, une demi-heure avant chacun des deux principaux repas, dans la dyspepsie acide.—Revue de Thérapeutique médico-chirurgicate.)

Solution anticancéreuse.—Giordano.