

rien d'anormal. Depuis avril dernier métrorrhagies rebelles à tout traitement, curage, etc.

L'examen fait reconnaître un fibrome utérin trop volumineux pour être enlevé par voie vaginale, c'est pourquoi la voie abdominale est préférée.

L'opération est longue et laborieuse, et la patiente étant déjà fortement anémiée avant l'opération, il va s'en dire que son état était extrêmement précaire après. Mais malgré tout, sous l'influence des stimulants—strychnine, spartéine, etc., et du sérum artificiel en grande quantité, injection faite dans les seins, la réaction se produit assez rapidement et la 27^{ième} journée après l'opération la patiente retourne chez elle se disant très bien.

Le troisième cas est dû à l'obligeance de M. le Dr Richer, rue Rachel, Montréal.

Dame L.... 26 ans, tempérament lymphatique, sujets tuberculeux, et de souche tuberculeuse. Régliée à seize ans, assez régulière. Devient enceinte une fois après son mariage. Accouchement difficile avec forceps, il y a douze semaines. Huit jours après la patiente remarquait que le développement de son abdomen paraissait anormal et ce n'est que ces jours-ci qu'elle consulte un médecin qui la dirige immédiatement à l'hôpital pour la faire opérer.

Durant les quatre jours avant l'opération, la température monte de 99° F. à 104° F., et tombe immédiatement après à 99° et 97° 3/5 F.

La laparatomie laisse voir un kyste de l'ovaire droit contenant environ cinq pintes d'un beau pus. Ablation totale et assez facile de ce kyste. Suites normales.

Laisse l'hôpital la 23^{ième} journée après l'opération.

L'autre cas est celui d'un double kyste papillomateux, de nature maligne, des deux ovaires, chez une femme de 33 ans. A été ponctionnée pour ascite considérable il y a trois semaines.

A l'ablation, l'opérateur rencontre beaucoup d'adhérence avec les organes voisins, intestins, utérus, rectum et les parois du bassin. Opération longue et minutieuse, mais sans incident remarquable. Suites assez normales.

Départ de l'hôpital, 25 jours après opération.

Enfin, trois autres cas tout aussi intéressants, mais ayant été opérés plus tard sont encore sous traitement.

La chirurgie et la médecine nous ont aussi fourni leur part d'intérêt, mais j'ai été peut-être un peu long pour en parler cette fois-ci.

Décembre 1898.