

# LA CLINIQUE

III<sup>ème</sup> ANNÉE

MARS 1897

No 8.

---

## REPRODUCTION

---

### FORMES CLINIQUES DE LA TUBERCULOSE INTESTINALE

Par L. GALLIARD, médecin de l'hôpital Tenon

---

#### I

*Maladie lente, ulcération, iléo-cæcale*, telle est, dans la majorité des cas la tuberculose de l'intestin.

Au point de vue clinique, quelle sera la signification de cette formule ?

*Maladie lente* : début insidieux, résistance aux médicaments, amaigrissement, débilité, cachexie.

*Ulcérations* : diarrhée, hémorragies, perforations, rétrécissement cicatriciel, occlusion intestinale.

*Localisation iléo-cæcale* : douleur au niveau de la fosse iliaque droite. Tumeurs de cette région.

Avec ces traits-là on ne constituerait pas un tableau clinique, mais on dessinerait une ébauche très convenable.

Assurément, l'ébauche n'est pas suffisante. Pour satisfaire notre curiosité scientifique, nous demandons qu'on nous donne de la précision dans les détails. Nous voulons la reproduction exacte du malade et, si possible, son image vivante,

#### II

Si l'on cherchait à étudier un parallélisme entre les lésions et