

gères d'exitation délirante ou maniaque, prélude d'un ramollissement cérébral ultérieur.

---

Contre les douleurs vives de l'ulcère de l'estomac, Alb. Mathieu obtient de meilleurs résultats en donnant 10 grammes de bismuth matin et soir, dilués dans un quart de verre d'eau tiède, l'estomac étant vide, qu'en prescrivant une seule dose massive de 20 grammes le matin en une seule fois, comme le font la plupart des auteurs.

---

Tripier et Paviot pensent que dans la lithiase biliaire la crise dite de coliques hépatiques ne relève pas toujours exclusivement de la migration d'un calcul. Elle peut être due à des poussées légères de péritonite aigue ou sub-aigue au voisinage de la vésicule biliaire.

---

L'aphasie peut être le premier symptôme de la méningite tuberculeuse de l'adulte. Elle est souvent d'abord passagère, de même que la cécité verbale. L'apparition d'un trouble de ce genre chez un sujet tuberculeux doit faire prévoir le développement d'accidents méningitiques.

---

Les malades atteints de rétrécissement mitral ont plus souvent l'aspect d'anémiques ou de neurasthéniques que de cardiaques. Ils sont pâles, chétifs, nerveux, à tendance hystérique, mélancolique ou hypocondriaque. Leur estomac est atone et les troubles dyspeptiques qui en résultent provoquent facilement des palpitations réflexes.

---

Dans une statistique de 1000 cas d'appendicite opérés par lui, Sonnenburg a noté des complications pulmonaires dans 5 p. 100 des cas, embolies ou infarctus, pneumonies et pleurisies.

E. M.