insectes. Ses œufs, au nombre de 4, sont d'un brun grisâtre, largement tachés d'olive brunâtre.

VII. Fam. DES SCOLOPACIDES. *Scolopacidae*.

Bec généralement plus long que la tête, à rainure se prolongeant au delà du milieu. Jambes à écailles transverses devant et derrière. Doigts avec ou sans membrane non marginés jusqu'à l'extrémité. Doigt postérieur généralement présent.

Cette famille qui renferme un grand nombre d'espèces, se divise généralement en deux sous-familles comme suit :

Bec couvert d'une peau flexible presque jusqu'à l'extrémité, qui est épaissie et élargie latéralement. Corps fort. Cou court et fort. Doigts généralement fendus jusqu'à la base. Ouverture de la bouche assez petite..... I. SCOLOPACINES

Bec couvert d'une peau flexible à la base seulement, l'extrémité dure, cornée et atténuée. Corps assez grêle. Cou et jambes grêles et allongés. Doigts ordinairement avec membrane à la base. Ouverture de la bouche large..... II. TOTANINES.

Sous-famille DES SCOLOPACINES. *Scolopacinae*.

Bec corné seulement au sommet, renflé à l'extrémité, à mâchoires poreuses et sensibles. Jambes courtes, à partie nue très courte. Doigt postérieur généralement présent et bien développé (excepté dans *Macrorhamphus*).

Cette sous-famille renferme 7 genres qu'on peut séparer les uns des autres, par les caractères suivants :

4. Bec à mandibule supérieure épaissie et recourbée sur l'inférieure à l'extrémité. Une rainure le long du sommet vers la pointe. Oreilles au dessous ou en avant des yeux. Queue non barrée ;
- a. Doigts fendus jusqu'à la base. Tarses plus courts que le doigt médian ;
- Cuisses emplumées jusqu'à la jointure ;
 ailes courtes ; 4e et 5e primaires les plus
 longues..... 1. PHILOHELA.