

consiste à faire une boutonnière à la partie supérieure de la vaginale à travers laquelle il fait passer le testicule et retourner ainsi la vaginale. Les sécrétions de la muqueuse n'ont jamais causé de trouble à ses opérés.

---

## LA SOCIÉTÉ MÉDICALE DE MONTREAL

À L'INSTITUT VACCINAL DE MONTREAL

---

Mardi, le 2 avril, en réponse à la gracieuse invitation de MM. les docteurs G. Archambault et J. Leduc, un grand nombre de membres de la société se sont rendus à l'institut pour visiter l'établissement. Messieurs les directeurs ont donné des renseignements des plus instructifs sur leurs méthodes de procéder pour la semence et la récolte du vaccin. Tous ont constaté avec plaisir que l'aménagement est des plus aseptiques et des plus modernes, que la technique opératoire est des plus scientifiques et que le virus vaccin exempt d'impureté doit être excellent.

Aussi les résultats obtenus par les médecins vaccinateurs de la ville sont très éloquents.

Plusieurs rapportent avoir vacciné 200, 300 et 500 personnes, et ne jamais avoir observé plus de 3 à 5 pour 100 d'insuccès.

Depuis 2 années 54 mille personnes ont été vaccinées avec la lymphé fournie par l'institut et aucune plainte ne fut rapportée au bureau.

Sans le secours du gouvernement, une installation aussi parfaite et aussi dispendieuse ne saurait rémunérer les directeurs dévoués à des travaux de la plus haute importance et d'une nécessité absolue.

---

Traitement de l'Erysipèle : Lavage antiseptique de la partie affectée. Scarification légère ; puis faites une douce compression avec de la tarlatane pour faire boire la sérosité exudée ; pansement une fois par jour à l'Ichthyol à 60 p. c., résultat : mort des streptocoques et, vie joyeuse, à votre malade.