

mentoso-asperis, ramis fructigeris nudis dependentibus, fructibus turbinato-globosis pedunculatis. *Lam. encycl.* 2. p. 494. *

F. (*terrigena*) foliis cordato-ovatis tomentosis asperis, surculis fructiferis, aliis ex arboris trunco dependentibus, aliis radicanibus subterraneisque. *Bory de St. Vincent itin.* 2. p. 143.

Erd-Feige. W.

Habitat in insula Mauriti et Borbonias. t. (v. f. f. fl.)

Folia quadri-seu ostopollicaria ovata acuta grosse remote et obtuse serrata basi leviter cordata quinque-nervia reticulato-venosa supra pilis brevibus obsita subtus hirta. Petioli pollicares vel bipollicares. W.

66. FICUS toxicaria. †

F. foliis cordato-ovatis subdenticulatis subtus tomentosis. *Mant.* 305.

Ficus Padana. *Burm. ind.* 226.

Houttuyn Lin. Pfl. Syst. 2. p. 547.

Giftige Feige. W.

Habitat in Sumatrae pago Padano. t.

Venenatissima fertur.

67. FICUS oppositifolia.

F. foliis oppositis obovato-oblongis serratis acutis supra scabris subtus hirtis, receptaculis globosis umbilicatis hirtis pedunculatis. W.

Ficus oppositifolia. *Roxb. corom.* 2. p. 14. t. 124. *

F. (*scabra*) foliis obverse ovatis acutis serratis scabris, fructibus globosis hirsutis. *Jacq. hort. Schoenb.* 3. p. 36. t. 315. *

F. (*hispida*) foliis petiolatis oblongis acutis, fructibus strigoso-hispidis. *Linn. suppl.* 442.

F. (*hispida*) foliis oblongis cuspidatis pilosis serratis, fructibus hispidis pedunculatis. *Thunb. diff. de ficu.* n. 24.

Ficus mollis. *Willd. Act. Acad. Berol.* 1798. p. 103. t. 5. (*excluso synonymo.*)

Perin-teregam. *Rheed. mal.* 3. p. 81. t. 61?

Paarblättrige Feige. W.

Habitat in India orientali. t. (v. v.)

Ab omnibus foliis oppositis diversa. Jeon et descri-