

*Papaveraceae**Papaver radicum* Rottb.*Cruciferae**Cardamine purpurea* Ch. et Sch." *digitata* Rich.Connue seulement au lac à l'Ours et à l'île
Herschel.*Parryamacrocarpa* R. Br.*Lesquerella arctica* (Rich.) Watson.*Melandion boreale* Greene.Des échantillons parfaits furent récoltés en latitude 67°N., 42 milles
au nord de la localité où le Dr Cairnes recueillit le type de ce genre en
1911.*Crassulaceae**Sedum Rhodiola* DC.*Saxifragaceae**Saxifraga tricuspidata* Retz." *flagellaris* Willd.

Nouvelle dans la région

Saxifraga Nelsoniana Don.*Theophron Richardsoni* (Hook). Wheeloc*Parnassia palustris* L.*Ribes triste* Pall." *hudsonianum* Rich.*Rosaceae**Spiraea betulifolia* Pallas.*Potentilla nivea* L." *fruticosa* L.*Rubus Chamaemorus* L." *arcticus* L." *stellatus* Smith.*Dryas Integrifolia* Ch. et Sch.*Sieversia glacialis* R. Br.*Rosa acicularis* Lindl.*Leguminosae**Lupinus Yukonensis* Greene.*Oxtripis podocarpa* Gray.*Hedysarum boreale* Nutt.*Empetraceae**Empetrum nigrum* L.*Violaceae**Viola palustris* L.