

Donc, tout malade affecté d'un tic douloureux de la face, tant soit peu rebelle, sera autant que possible confié aux soins d'un stomatologiste expérimenté, disposant de l'outillage que nécessite un examen minutieux de la bouche et de ses annexes. A lui d'instituer le traitement spécial que pourra commander éventuellement le résultat de cet examen.

En cas d'échec des diverses interventions que nous venons de passer en revue, le traitement opératoire sous la forme de la résection du nerf maxillaire inférieur, de l'extirpation du ganglion de Gasser ou de la section du sympathique cervical s'offre à nous, comme l'ultima ratio, comme la dernière ressource qui nous reste, pour débarrasser le malade de ses horribles souffrances.

R. BOULET.

THÉRAPEUTIQUE

Posologie de la digitaline par Huchard; *Scalpel* Decembre 1906.

Il y a trois manières, dit-il de prescrire la digitaline cristallisée répondant à trois indications spéciales dans les cardiopathies.

1° *La dose massive.*—C'est la dose antiasystolique et diurétique: 50 gouttes de la solution au millième (soit un milligr. de digitaline) en une ou deux fois pendant un seul jour. L'effet est généralement obtenu après 36 ou 48 heures. Répéter la dose huit ou dix jours après si l'effet a encore été insuffisant.

2° *Dose faible ou sédative.*—C'est celle qui combat les palpitations l'érythème cardiaque et la dyspnée du rétrécissement mitral même à sa période de compensation. On donne 5 à 10 gouttes de la solution au millième pendant cinq jours de suite et on recommence toutes les trois ou quatre semaines.

3° *Doses très faibles.*—C'est la dose d'entretien ou cardio-tonique qui n'exerce qu'une action cardiaque et non diurétique et que l'on peut continuer pendant des semaines et des mois en cessant tous les quinze ou vingt jours pendant une ou deux semaines. Elle est de deux à quatre gouttes par jour de la solution au millième.

La Scopolamine.—Un medecin italien, le Dr Parlavecchio, de Palerme, a employé systématiquement ce procédé de narcose dans 200 opérations portant sur toutes les parties du corps. Dans 30 p. 100 l'anesthésie produite par ce procédé, seul, fut suffisant, dans les autres, il fallut le chloroforme. Cet auteur constate que la respiration est moins fréquente, le pouls plus rapide, il atteint quelquefois 150 où il se maintient durant 2 ou 3 jours. Dans les grandes opérations abdominales cela devient inquiétant, car on ne sait plus si ce fait est dû à l'anesthésie ou à une infection commençante. En outre, la scopolamine serait contreindiquée chez les enfants au-dessous de 10 ans.

A part cela, cet auteur en serait satisfait. Elle diminue la fréquence des vomissements, permet des interventions longues chez les malades affaiblis: cardiaques, néphritiques, alcooliques, tuberculeux; elle est surtout utile dans les opérations sur la face ou le cou, car elle ne supprime pas la déglutition.

A. LeSAGE