2° Déterminer la valeur relative des aliments consommés pour chaque 100 livres de gain en poids vif, chez des bœufs respectivement de 3 ans, 2 ans, 1 an et chez des veaux châtrés.

ENGRAISSEMENT DE BŒUFS DE DEUX ANS.

Huit bœufs de 2 ans ont été achetés et séparés en quatre lots aussi semblables entre eux que possible pour la qualité et la grosseur. Ils paraissaient tous avoir du sang de race Courtes-Cornes.

Pendant la période préparatoire, qui a duré du 29 octobre au 1er décembre, les animaux ont tous reçu la ration suivante :

M."	SII	ivante
Maïs ensilé	25	livres.
reacines	70	4.2
raine nachée	15	4.1
rois moulus	0	4.
Orge moulue	3	66

96 livres.

q n p se êt

au

so

far

Nº 8

D reçu

On leur donnait autant de ce mélange qu'ils en voulaient manger. Le 29 octobre, le poids moyen des animaux était 1,079 livres

chacun; le 1er décembre, il était de 1,155 livres, ce qui faisait un gain de 76 livres par animal.

Le tableau III présente la composition des 3 rations de l'expérimentation :—

TABLEAU III.

RATION Nº 1.	Lbs.	RATION Nº 2.	Lbs.	RATION Nº 3.	Lbs
Ma's ensilé	20 10 20 5 2 2 2	Foin haché Racines Paille hachée Tourteau de lin Pois moulus Orge moulue	20 40 5 2 2 2 2	Mays ensilé Paille hachée Tourteau de lin Pois moulus Orge moulue	50 5 2 2 2 2