

LES PETITS LAVEMENTS MÉDICAMENTEUX DANS LA
MÉDECINE DES ENFANTS

Pour combattre les préjugés qui s'opposent à l'emploi plus fréquent des petits lavements médicamenteux, M. le Dr Montenuis, de Dunkerque, signale d'abord, dans une étude intéressante sur ce sujet, publiée dans le *Journal de Médecine et de Chirurgie pratiques*, le prix relativement élevé qu'exige l'acquisition d'une seringue spéciale.

Or, quoi qu'en dise, par erreur, M. le docteur Condamin, qui a inventé à cet usage une seringue et une canule spéciale, M. Montenuis prétend que le petit lavement médicamenteux ne comporte aucune instrumentation spéciale. Il suffit que toute seringue urétrale fonctionne bien pour introduire d'office un médicament en solution concentrée par la voie rectale. Contrairement à une erreur encore en cours, la seringue urétrale est suffisamment longue pour être utilisée avec succès ; néanmoins, il est encore des médecins, et surtout des mères, qui ne sont pas partisans de la seringue en verre.

Heureusement, on trouve partout, aujourd'hui, à un prix réellement modéré, de petites seringues de 5 à 6 centimètres cubes de contenance, terminées par un embout en gutta-percha, exemptes de tout danger, et qui, sous le nom de *seringue pneumatique*, fonctionnent avec une grande régularité. Telle est la seringue qu'emploie de préférence notre confrère français. Grâce à la méthode des petits lavements qu'elle permet d'administrer, elle est appelée tous les jours à rendre des services signalés, en répondant à une foule d'indications malaisées à remplir, particulièrement chez les enfants, savoir :

I. *Dans les convulsions* survenant presque toujours à la suite d'une indigestion ou de constipation. Dans quel embarras ne se trouve pas alors le médecin obligé d'agir vite et bien ! Deux raisons s'opposent à recourir à l'ipéca. En premier lieu, ce médicament arrive trop tard généralement pour expulser les toxines, causes de l'indigestion et des convulsions, et alors qu'il n'y a plus de résidus dans l'estomac ; en second lieu, l'état convulsif ne permet pas d'agir avec un vomitif.

Que faire ? L'indication urgente, dit l'auteur, est de vider l'intestin, puis de calmer le système nerveux. A cet effet, au lieu de grands lavements, longs à préparer, difficiles à administrer et à faire garder, on donnera un petit lavement avec une cuillerée ou même une demi-cuillerée à café de glycérine pure. De cette façon, on obtient sûrement et rapidement une débacle ordinairement en moins de 10 minutes.