

Cameline; False Flax, Gold of Pleasure.—*Camelina Sativa*, Crantz, Europe.—1 an et ann. d'hiver, 1-2 pds.—Jaune, 1/4 pc.; grappes; cosses en forme de poire, à graines nombreuses.—Graines dans le grain, la graine de lin et de trèfle.—Champs de grain, de blé d'automne, de lin et de trèfle.—Arracher, jachérer, plantes sarclées, blé de printemps.

MOUTARDE ROULANTE

Neslie; Ball Mustard.—*Neslia paniculata* (L.), Desv., Europe.—1 an et ann., 1-2 pds.—Jaune orange, 1/8 pc.; grappes très allongées à maturité; cosses presque sphériques, à 1 grane.—Graines, dans le grain.—Champs de grain.—Arracher, jachérer, plantes sarclées.

Bourse-à-pasteur; Shepherd's purse.—*Capsella Bursa-pastoris*, Medic., Europe.—1 an et ann., 1-2 pds.—Blanc, 1/8 pc.; grappes très allongées à maturité; cosses en forme de triangle.—Graines.—Partout.—Sarcler et biner constamment.

Tabouret des champs; Stinkweed, Penny Cress.—*Thlaspi arvense*, L., Europe.—1 an et ann., 1-2 pds.—Blanc, 1/8 pc.; grappes très allongées à maturité; cosses plates, rondes, plus de 1/2 pc.—Graines.—Champs de grain, lieux incultes.—Faucher et brûler, biner soigneusement.

Passerage; Peppergrass.—*Lepidium apetalum*, W'ld. (= *L. intermedium*, Gray), native.—1 an et ann., 1-2 pds.—Blanchâtre, 1/16 pc.; grappes très allongées à maturité; cosses arrondies, 1/8 pc. à 2 graines.—Graines.—Champs de grains, après printemps humide.—Labourer et biner automne et printemps.

Cléomé; Spider Flower.—*Clome integrifolia*, L., native.—1 an, 1-3 pds.—Violet rougeâtre, 1 pc. pétales 4. étamines 6. longues; grappes, cosses aplaties, pendantes, 1 1/2 pc.; feuilles à 3 divisions, odeur forte.—Graines, transportées par l'eau.—Champs de grains, lieux bas.—Arracher, biner.

HYPERCINÉES

Mille-pertuis; Common St. John's-wort.—*Hypericum perforatum*, L., Europe.—Vivace, 1-2 pds.—Jaune, 1/2 pc.; cymes.—Graines, dans