

外陰切開術

外陰切開術是一七四二年由O.E.氏首次介紹的，其目的是為給子胎兒逐出抵抗的外陰作手術開放。初起，這一手術曾受到人們的非議，但以後卻逐漸地受到人们的接受。在十九〇〇年後，有百分之三十至百之七十分之八的婦女作外陰切開術。它已成為僅次於臍帶切開術的一種最常用的的手術。不少醫師已對所有的初產婦常規地應用這種手術。長期以來，婦產科醫師認為外陰切開術的好處在於它可保存其功能，包括支持骨盆器官，如膀胱、子宮和直腸，且可增強性功能。此外還可防止胎兒大腦受壓縮，繼而防止了其後的神經病變。

胎兒大腦免受壓縮，繼而防止了其後的神經病變。

胎兒大腦受壓縮，繼而防止了其後的神經病變。

據

指

導

之

下

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。

。