

M.—A l'aide d'un porte-caustique autour duquel on enroule de l'ouate hydrophile, on porte cette mixture dans toute la longueur du canal cervical.—*Revue internationale des sciences médicales.*

Syphilome cérébral.—*Bartholow.*

P.—Protoiodure de mercure.....	$\frac{1}{6}$ grain.
Extrait de belladone.....	$\frac{1}{4}$ “
Extrait d'opium.....	$\frac{1}{2}$ “

M.—Pour une pilule, à prendre toutes les quatre heures. En même temps, le malade prendra 20 grains d'iodure de sodium⁴ toutes les quatre heures.—*College and Clinical Record.*

Ecthyma.—*Ringer.*

P.—Sulfate de quinine.....	$\frac{1}{2}$ drachme
Acide sulfurique aromatisé.....	$\frac{1}{2}$ “
Teinture de cardamome comp.....	$1\frac{1}{2}$ once
Eau distillée.....	q. s. pour faire 5 onces

M.—*Dose*: Une cuillerée à dessert trois fois par jour.—*Leonard's Medical Journal.*

Prurit sénile.

P.—Extrait de noix vomique.....	$\frac{1}{4}$ grain
Extrait de belladone.....	$\frac{1}{4}$ “

M.—Pour une pilule, à prendre matin et soir.—*College and Clinical Record.*

Pityriasis.—*Da Costa.*

P.—Teinture de perchlore de fer.....	20 gouttes
Solution de chlorure d'arsenic.....	5 “
Sirop } de chaque, q. s. pour faire.....	1 drachme
Eau }	

M.—A prendre en une seule dose, trois fois par jour.—*College and Clinical Record.*

Limonade ferrugineuse.—*Goodell*

P.—Teinture de perchlore de fer.....	6 drachmes
Acide phosphorique dilué.....	6 “
Essence de citron.....	2 “
Sirop simple, q.s. pour faire.....	6 onces

M.—*Dose*: Deux cuillerées à thé dans un peu d'eau, après chaque repas, Ceci constitue un excellent mode d'administration de la teinture de fer.—*Columbus Medical Journal.*