

Chez l'enfant, je l'associe à l'ipéca sous forme de sirop de Dessimartz (dont 20 grammes correspondent à 0 gr. 10 de poudre d'ipéca) :

Benzoate de soude.....	1 gramme.
Tincture d'aconit.....	X gouttes.
Sirop de gomme .....	20 grammes.
— Désimartz.....	10 —
Eau distillée Q.S. pour.....	90 cent. cubes.

À la seconde période de la bronchite, le benzoate de soude trouve encore son indication ; il est alors utile de le prescrire avec la terpine, plutôt qu'en pilules.

Terpine.....	0gr, 20 centigr.
Benzoate de soude.....	0gr, 56 —
Poudre de Dover.....	0gr, 15 —

pour un cachet. Un à chaque repas et boisson chaude à la suite.

Le benzoate de soude, associé à l'acétate d'ammoniaque, dans la pneumonie, entrera utilement dans la composition de la potion que l'on ne saurait refuser au malade et surtout à son entourage.

Il est classique de prescrire le benzoate de soude associé au salicylate de soude, dans la *lithiasè biliaire* ; on formule :

Salicylate de soude.....	} à 0 gr, 50 centigr.
Benzoate de soude.....	

pour un cachet. Deux ou trois par jour.

Ne pas oublier de les faire prendre avec des boissons chaudes dont l'effet n'est pas négligeable !

Il est également classique de prescrire le benzoate de soude dans la *cystite*, la *pyélo-néphrite* :

Benzoate de soude.....	} à 0 gr, 10 centigr.
Térébenthine neutre.....	
Goudron de Norvège.....	

pour une pilule. Six par jour.