

Cet épithélioma avait pour siège la paupière inférieure de l'œil droit ; à dix millimètres du bord palpébral, gagnant la commissure interne. En examinant avec attention on voit que la muqueuse conjonctivale est intacte, la peau de la paupière seule est atteinte. Comme dimension la tumeur peut avoir quatre centimètres de long, sur deux de haut (maximum).

Il y a quatorze mois, l'affection a commencé par un petit bouton, la malade grattant continuellement ce bouton, il se forma une plaie qui augmenta continuellement en surface. La patiente poursuit son histoire, en nous disant qu'elle a toujours eu une bonne santé ; pas de cancers dans sa famille ni du côté de la mère, ni du père. Urines normales. Vision égale 1 : O. D. et O. G.

Opération

Chloroformisation, lavage avec du sublimé au 1000ième.

Je fixe d'abord la paupière avec la pince de Darier. J'excise la tumeur de la façon suivante : La paupière bien tendue, je prends un bistouri et je sillonne profondément tout le pourtour de la tumeur, en rasant en haut le bord des cils et dans les autres régions en empiétant de deux centimètres sur les tissus sains. Ceci fait, je prends avec une forte pince à dissection les tissus à enlever, et j'enlève toute la partie malade, en ayant soin d'aller profondément de peur qu'il n'y ait des prolongements cancéreux dans les parties profondes. Je pince et ligature quelques petits vaisseaux. Je tamponne et le sang arrêté, je nettoie ma plaie et procède à un curetage complet. Pour être bien certain qu'aucune parcelle de tumeur reste, je cautérise fortement la plaie au thermo-cautère.

Toutes les fois que nous avons affaire à un épithélioma, il faut agir énergiquement, et ne pas avoir peur d'enlever du tissu sain si l'on ne veut avoir des récidives. Le traitement des épithélioma de la face a été dernièrement le sujet de nombreuses études. Dans tous les cas avancés le meilleur traitement est une intervention chirurgicale. Si la tumeur est petite on peut essayer des moyens plus doux : galvano ou thermo-cautère seuls ou associés, à l'acide chromique, le chlorate de potasse ou les pâtes arsénicales.