

E. et R. Se nourrit d'écureuils, de mulots, de canards et attaque même jusqu'aux lièvres; niche dans les conifères; pond 2 à 4 œufs d'un blanc bleuâtre sale souvent avec taches de brun.

3. L'Autour brun. *Accipiter fuscus*, Gmel. *A. Striatus*, Vieil. *Falco velox* et *Pennsylvanicus*, Wils. *Sparverius lineatus*, Vieill. *Nisus Malfini*, Lesson.—Vulg. *Buse brune*; Angl. *Sharp-Shinned Hawk*.—Longeur 12-14 pouces; ailes 7½-8; queue 6½-7 pouces. Bec d'un bleuâtre de corne foncé; cire et tarses jaunes; iris jaune-rougeâtre. Parties supérieures brun-foncé, chaque plume liserée de roux; occiput maculé de blanc; parties inférieures blanchâtres, avec macules brunes et lignes longitudinales noires interrompues; queue brune, avec 4 bandes plus foncées. Rémiges avec bandes plus foncées et tachetées de blanc sur le bord interne; secondaires et tertiaires avec de grandes taches blanches en partie cachées. (Mus. Univ. Lav.).

E. et C. Se nourrit de petits quadrupèdes, d'insectes et d'oiseaux; niche dans les conifères; pond 4 œufs d'un blanc bleuâtre tachés de chocolat brun, au gros bout.

3 Gen. BUSE. *Buteo*, Cuv.

Bec court, large à la base et courbé de ce point; bords de la mandibule supérieure lobés mais non dentés; ailes longues, 4e et 5e rémiges les plus longues; tarses moyens, robustes, avec écailles transversales devant et derrière; ongles forts.

Ce genre renferme 5 espèces dans notre faune.

1. Buse de Swainson. *Buteo Swainsoni*, Banap.—Angl. *Swainson's Hawk*.—Longueur 18 pouces; ailes 15 pouces. Bec brun; cire et tarses jaunes, ongles noirs. Parties supérieures brun mélangé de roux sur le derrière de la tête; 2e et 3e rémiges les plus longues; parties inférieures roussâtres avec une ligne noire sur chaque plume; cuisses blanchâtres, à bandes transversales roussâtres; queue brune, à bandes transversales noires, blanche en dessous avec bandes noires.

E. et R.

2. Buse du Canada. *Buteo insignatus*, Cassin—Angl. *Brown Hawk*, *Canada Buzzard*.—Nous n'avons pu trouver nulle part la description de cette espèce dont le musée de la Société d'Histoire Naturelle de Montréal, d'après Mr. Lemoine, possède un spécimen, tué près de cette ville en 1854. Ne serait-ce pas une variété de plumage de quelqu'autre de ses congénères?

3. Buse à queue rousse. *Buteo ferruginei caudatus*, Vieill. *B. fulvus*, *Americanus*, *borealis*, Vieill. *Falco borealis*, *Jamaicensis*, Gmel.