

la plupart des sujets qui se présentent à nous souffrant d'hémoptisie commencent toujours par nous confier qu'ils ont *vomi* le sang.

Dans l'hémoptisie, le sang est rutilant, aéré, et fait suite à des efforts de toux, et le malade, toutes choses égales d'ailleurs, s'affaiblit beaucoup plus à la suite de l'hématémèse qu'à la suite de l'hémoptisie.

Durant l'hémoptisie la voix est généralement plus ou moins voilée, et les crachats contiennent toujours un peu de sang, plus ou moins foncé cette fois, durant les quelques jours qui suivent l'hémorrhagie. Au contraire, dans l'hématémèse, le sang peut bien être rouge au début, mais pour peu qu'il ait séjourné dans l'estomac, il prend une teinte plus foncée; au lieu d'être aéré, il a plutôt une consistance sirupeuse. En outre, il est plus ou moins mélangé aux aliments contenus dans l'estomac. Dans l'hématémèse, il est rare que les vomissements soient nombreux; enfin j'ajouterai que la plupart du temps l'hémorrhagie de l'estomac s'accompagne de syncope. Fort heureusement cette syncope est salutaire, en ce sens qu'elle contribue puissamment à faire cesser l'hémorrhagie. La pâleur de la face est généralement très marquée, de même que la faiblesse générale, tandis que dans l'hémoptisie la face est animée et la faiblesse n'est pas proportionnée à la quantité de sang expectorée, sauf dans le cas, tout à fait exceptionnel, où l'hémoptisie est foudroyante.

Le traitement, dans le cas qui nous occupe, comporte deux points principaux: Repos absolu et hygiène. Le malade doit garder autant que possible la position horizontale, la tête légèrement élevée et les jambes pendantes. La chambre devra être bien ventilée, et abondamment pourvue d'air frais. Repos absolu de l'estomac, aussi longtemps que la chose se pourra faire; tout au plus permettra-t-on au malade de sucer de petits morceaux de glace. Quant aux médicaments, un excellent moyen de combattre l'hémorrhagie, c'est l'injection hypodermique d'ergotine, à la dose de 2 grains, d'après la formule suivante recommandée par Bartholow:

Ergotine (extrait aqueux),	1	drachme
Glycérine.....	1	"
Eau distillée.....	7	drachmes

M.—Dose: 16 minimes (2 grains d'ergotine), en injection sous-cutanée, et répéter au besoin. Des applications froides sur la région épigastrique sont rationnellement indiquées.