

peu copieuses, mais qui ont soulagé beaucoup. Le ventre est moins ballonné, la douleur est nulle du côté gauche, moins prononcée du côté droit. On peut palper le point de McBurney sans résistance de la part du malade. L'endroit où la douleur est le plus sensible est sur le rebord du foie. Lavement à l'eau chaude. Opium, $\frac{1}{2}$ gr. *ter die*. Glace. Pouls 96. Selles durant l'avant-midi.—12 a. m. Pouls faible. Brandy.—8 p. m. Pouls faible, petit. 102.8° . Selles douloureuses. Vomis son café. Facies déprimé. Injection sous-cutanée. Opium, 1 gr.

Déc., 19.—Légère selle ce matin. A dormi assez bien durant la nuit (opium), Pouls 92, plus plein qu'hier. Température 99.8° . Prendra du brandy.—8 p. m. Pouls 92, régulier et petit. Température 101° . Peu de douleurs. Abattement.

Déc., 20.—8 a.m. Pouls 92 ; température, 100° . Pouls irrégulier et petit. Ventre dur, plein. Pas de sellos. Se sent mal. 9. a.m. Selle abondante. Pouls régulier et plus plein.—8 p. m. Pouls 92, assez plein, régulier. Température 101° .

Déc., 21.—10 a.m. Pouls 80, régulier, peu fort. Température, 99.2° . La tympanite a cessé. Facies ranimé. Presque plus de douleurs à l'abdomen. La jambe droite est très douloureuse au genou et à la cheville. C'est depuis hier soir. La jambe gauche faisait un peu mal, hier, mais pas aujourd'hui. Pas de glace durant la nuit précédente. Pas d'opium hier soir ni ce matin.—7 p. m. Pouls bon. Température 100.5° . Plusieurs selles durant le jour, aisées, sans douleur. Vers le soir seulement, un peu de douleur dans la fosse droite. Traitement alcalin de Fuller.

Déc., 22—10 a.m. Pouls 84, régulier, suffisamment plein. Température, 99.2° . Un peu de douleurs intestinales durant la nuit. Les selles deviennent toujours faciles. Il y a toujours, dans la fosse iliaque droite, un point dououreux à la pression, mais beaucoup moins (il semble que ce point est plus rapproché du ligament de Poupart). La douleur au genou et au pied est bien diminuée (traitement alcalin de Fuller).—8 p. m. Température, 100° . Pouls régulier, plus fort. Plus de douleurs, ni au ventre, ni aux jointures ; celles-ci sont raides, seulement Borborygmes.

Déc., 23.—12 a.m. Pouls 88, régulier, plein, un peu bondissant. Température, 99.8° . Douleur depuis le matin dans la jambe gauche. Cette douleur se passe dans la soirée.

Déc., 24.—9 a.m. Température 99.5° . Pouls 80, plein, régulier. Il n'y a plus qu'un peu de douleur dans la fosse iliaque droite, lorsqu'on presse fortement. Le malade est dispos, mange avec appétit.—12 a.m. Température, 100° . Plus de douleur aux jambes, si ce n'est quand le malade tente un mouvement.—8.30 p.m. Température, 99.5° . Les selles un peu difficiles ; purge demain matin.

Déc., 26.—9 a.m. Température normale. Pouls régulier. Selles faciles. Plus de rhumatisme. Douleur sourde à pression forte ou effort de défécation. Quelquefois de soi-même. Ne saurait se cou-