

né, le petit bandage en caoutchouc en fer à cheval est seul bien supporté ; son efficacité, il est vrai, est médiocre. Vers l'âge d'un an, on peut appliquer un bandage à pelote, anglais ou français, de préférence bilatéral, car il tient mieux, et d'autre part la bilatérilité de la hernie est fréquente, même quand au premier abord elle n'est pas évidente. La cure radicale ne sera entreprise qu'en cas d'étranglement, ou lorsque, malgré le bandage, la hernie aura tendance à grossir constamment, devenant ainsi une cause de dépérissement pour l'enfant. On sera d'ailleurs averti que si, dans ces conditions, le résultat est compromis au point de vue de la perfection de la réunion immédiate, la gravité opératoire est cependant nulle.

Passé la première enfance, lorsque l'enfant sera devenu propre au lit, on deviendra moins réservé. On essaiera pendant quelques mois la cure par le bandage, mais pour peu qu'elle semble défec-tueuse, on proposera la cure radicale ; et jamais on ne la refusera, si l'enfant est en bon état, à des parents qui d'emblée la préfé-reront au supplice du bandage.

2° *Hernie avec ectopie testiculaire.*—Chez le nouveau-né, la complication d'ectopie est une contre-indication au bandage, qui empêche le testicule d'achever sa migration, sans cela assez fré-quente. On laissera donc les choses en état, quitte à opérer si la hernie s'étrangle ou si l'enfant dépérit.

Chez l'enfant plus âgé, il faut examiner si l'on peut isoler de la tumeur le testicule que l'on maintiendra dès lors, si l'on veut, au-dessous de la pelote en fourche d'un bandage spécial. Si le testicule n'est pas isolable, le port d'un bandage est proscrit pour le même motif que chez le nouveau-né. Ces distinctions, il est vrai, n'ont plus grande importance à nos yeux, car, grâce à l'anti-sepsie, nous considérons que passé dix-huit mois à deux ans toute hernie avec ectopie doit être traitée par la cure radicale suivie d'orchidopexie.

3° *Hernie étranglée.*—La plupart des hernies étranglées chez l'enfant peuvent être réduites par le taxis, et leur étranglement, en outre, est en général peu serré. Il n'y a pas longtemps encore on tendait même, classiquement, à considérer cette règle comme absolue. En réalité, il y a des hernies inguinales étranglées qui résistent au taxis, même sous le chloroforme. Il va sans dire que celles-là doivent être opérées par la kélotomie suivie de cure radi-cale, et il est incontestable que l'on obtient, même chez l'enfant