

peuvent mettre en défiance et doivent faire étudier avec soin le diagnostic. D'abord le début a eu lieu très brusquement, plus que dans la fièvre typhoïde, après une période de prodromes relativement courte, quatre jours au plus. Or, dans la dothiéntérie, il y a d'ordinaire une aggravation insensible des symptômes prodromiques qui conduit peu à peu à la période de début. De plus notre malade est constipée depuis huit jours, ce qui est rare au début d'une fièvre typhoïde, ou la débâcle intestinale ne tarde pas aussi longtemps à se produire, et il n'existe pas de gargouillement dans la région cœcale alors qu'il y en a un peu dans le colon. Or, nous avons constaté dans l'épidémie de grippe de l'année dernière que cette localisation était habituelle dans la grippe. C'est l'existence de ces nuances symptomatiques et aussi la persistance de l'hyperesthésie cutanée et des douleurs musculaires qui m'ont fait porter hier devant vous le diagnostic de grippe à forme typhoïde, malgré l'existence des taches rosées et de l'hypertrophie de la rate, signes qui accompagnent du reste aussi bien la grippe que la dothiéntérie. Je vous annonçais que, si mon diagnostic était exact, nous verrions dans un jour ou deux la température tomber brusquement, c'est ce qui est arrivé, puisque le lendemain, septième jour de la maladie, elle est descendue à 93° . Depuis, après avoir oscillé pendant quelques jours autour de ce chiffre, elle est remontée à 100° s'y est maintenue pendant 48 heures pour retomber définitivement. L'amélioration des symptômes généraux et locaux coïncida avec la chute de la température et il ne reste plus aujourd'hui, chez cette jeune fille, qu'une dépression profonde des forces, résultat de l'infection à laquelle elle a été soumise.

Cette forme clinique de la grippe est assez rare et ne s'observe guère que sur des cas isolés, surtout au début des grandes épidémies : elle a été signalée souvent, mais je ne crois pas qu'elle ait été le sujet d'un travail d'ensemble.

Les premières manifestations de l'épidémie de grippe de 1891-92, revêtirent, pendant environ quinze jours, dans mon service de l'hôpital de la Charité, exclusivement le type abdominal ou plutôt typhique. La similitude des symptômes observés alors avec ceux de la dothiéntérie fut même telle que, n'ayant