

Lophyre du-sapin. *Lophyrus abietis*, Harr. Inj. Ins. p. 411.

♀—Long. .28 pce. D'un jaune brunâtre; les yeux, les antennes, une tache sur les lobes latéraux du mésothorax, noir. Antennes courtes, à dents longues et serrées, plus larges au milieu. Ailes hyalines, le stigma blanchâtre, les nervures brunâtres. Pattes et tout le dessous plus pâle que le dessus et sans aucune tache. Dans les ♂ les antennes sont poilues et bipectinées, la tête, le thorax, le dos de l'abdomen, noir, les pattes et le ventre jaune-roussâtre.—Hull (Harrington).

Il ne serait pas surprenant qu'on pût rencontrer cet insecte à Québec même. Nous avons trouvé à Danville, en 1880, un jeune pin ravagé sérieusement par des larves de Lophyres, c'étaient probablement celles de cette espèce.

2. Lophyre d'Abbott. *Lophyrus Abbottii*, Leach—Zool. Misc. III, 1819; Trans. Am. Ent. Soc. II, 324.

♀—Long. .32 pce. D'un testacé brunâtre; les antennes noires, de 17 articles, chaque article, excepté les 3 de la base et le terminal, avec un appendice moussu en dedans. Les trois articles terminaux des palpes maxillaires courts, le 3e aussi long que le 4e et le 5e. La tête, le thorax et les flancs couverts de grosses ponctuations peu denses. Eperons des jambes postérieures longs et moussus, les ongles avec une forte dent en dedans peu éloignée de l'extrémité. L'extrémité des mandibules, les côtés du méta-thorax et les ongles, noir; les palpes, les écailles alaires, les flancs avec les côtés de l'abdomen et les jambes, d'un blanc de cire. Ailes légèrement obscurcies, la cellule lancéolée fermée par une nervure légèrement oblique.

♂—Antennes de 18 articles dont 15 portent un rameau de chaque côté, le dernier en massue, noires de même que le corps; le labre, les pattes, les écailles alaires et le collier, blanc; le reste du corps et les pattes jaune-brunâtre. La moitié basilaire des ailes obscurcie; cellule lancéolée avec une nervure droite.—Hull (Harrington).

Capturé sur des pins à Hull.