

du sang et des expectorations ; on observe s'il existe de l'accélération pu pouls, de l'insomnie, céphalalgies, vertige, légère courbature, fatigue générale, dyspnée, rougeur des pommettes.

Le traitement a été surtout indiqué chez les sujets dont la résistance organique est suffisante, chez les apyrétiques, les malades suspects, les prédisposés, ceux légèrement atteints ou porteurs de lésions stationnaires. On l'a appliqué à la laryngite ulcéreuse, à la péritonite bacillaire, lupus, tuberculoses urinaires et chez les enfants aux tuberculoses péritonéale, articulaire, osseuse, ganglionnaire.

Le traitement est contre-indiqué dans les tuberculoses en évolution rapide, les tuberculoses aiguës et subaiguës, les tuberculoses chroniques avec phases de poussée aiguë, ainsi que chez les très jeunes enfants déjà atteints de tuberculose pulmonaire.

En même temps les injections sont pratiquées, le traitement diététo-hygiénique est très sévèrement suivi. L'association des nombreux médicaments administrés au cours de la tuberculose n'est fait qu'avec la plus grande prudence. La méthode mixte qui combine l'emploi des sérums antituberculeux avec la tuberculinothérapie a été préconisée.

Dr Paul LEMAIRE.

Gazette Hebdomadaire des Sciences Médicales.

ACCUSE DE RECEPTION

Nous accusons réception des deux brochures suivantes : "*Le Charlatanisme au flambeau de la loi*", Docteur Jos. Gauvreau ; "*Un comité de rédaction en bottes*", Docteur Jos. Gauvreau.