

**CEPHALAGIE.** — Rechercher la cause et la traiter (voir chlorose, hystérie, syphilis, néphrite chronique, etc.)

Dans la céphalagie passagère, conseiller le repos dans l'obscurité et prescrire la potion suivante, à prendre par cuillerée à bouche toutes les heures.

℞	Analgesine.....	2 grammes.
	Bromure de potassium.....	30 —
	Sirup de laurier-cerise.....	30 —
	Hydrolat de cannelle Q. S. pour 125 c. cubes.	
	M. s. a.	

Modifier l'état des voies digestives en prescrivant le purgatif suivant :

℞	Sulfate de soude.....	50 grammes.
	Sirup de cerise.....	50 —
	Eau distillée.....	300 —
	M. s. a.	

A prendre en trois fois à 10 minutes d'intervalle.

**ABCÈS.** — 1° **ABCÈS CHAUD :** Le véritable traitement est l'incision, pratiquée avec toutes les précautions antiseptiques. Laver ensuite la plaie avec la solution suivante :

℞	Bichlorure Hg.....	1 gramme
	Acide tartrique.....	1 —
	Eau distillée.....	1000 —
	M. s. a.	

Drainer et panser à la gaze iodoformée.

2° **ABCÈS FROID DU TISSU CELLULAIRE SOUS-CUTANÉ :** La meilleure pratique consiste dans l'ablation de l'abcès et de sa paroi, sans ouvrir la poche, puis de saturer après lavage antiseptique sans placer de drain.

3° **ABCÈS FROID, OSSIFLUENT :** Si l'étendue de la poche n'est pas trop considérable, le traitement consiste dans l'incision, cautérisation et drainage. Si la région envahie est importante, il faut s'en tenir à la ponction, et, après évacuation, injecter quelques centimètres cubes de la solution suivante :

℞	Iodoforme.....	2 grammes 50
	Ether officinal.....	50 —
	M. s. a.	

DR. A. PAULY.

## POSOLOGIE

**ANALGESINE (antypirine).**—Poudre blanche cristallisée, inodore, très soluble dans l'eau.

Ana'gésique, antithermique, antigalactogène modificateur nervin, hémostatique.

S'emploie, à l'intérieur, à la dose de cinquante centigr., à trois grammes par jour.

Comme hémostatique, applications locales, poudre ou solution à 1/10.

Si on prescrit l'analgesine en cachets, il ne faut pas l'associer avec le salicylate de soude, car au bout de peu de temps, le mélange devient huileux.

Cette décomposition n'a pas lieu en présence de l'eau, on peut donc prescrire analgesine et salicylate de soude sous forme de potion.

**APIOL.**—Liquide huileux retiré des fruits de l'*Apium petroselinum*, insoluble dans l'eau, soluble dans l'alcool et dans l'éther, fébrifuge emménagogue,

S'emploie sous formes de capsules gélatineuses à la dose de cinquante centigr. par jour.

**ARISTOL (Thymol bi-iodé).**—Poudre amorphe, rouge brun, à odeur faible d'iode et de thymol, insoluble dans l'eau et dans la glycérine, soluble dans l'éther, altérable à la lumière. — *A suivre.*